

Blutspende SRK

Change File Book – Spendetauglichkeitskriterien

Version 24.0
In Kraft ab 01.02.2024

Affenpocken	Neues Kriterium
Augentumorenentfernung	Verweise: "gehe zu" statt "siehe auch"
Blepharitis (Lidrandentzündung)	Verweise: gelöscht Vorgehen: neu formatiert
Covid-19	Neues Kriterium
Gastritis	Vorgehen: Ergänzung von "oder Protonenpumpenhemmer"
Hämochromatose	Vorgehen: Akzeptieren, falls lediglich genetische Veranlagung ohne Eisenüberladung (mit normalem Spendeintervall). Normale Spendeintervalle. Die Spendefrequenz kann bei Männern 6 x pro Jahr und Frauen 4 x pro Jahr betragen. Das Spendeintervall von 10 Wochen kann unterschritten werden.
Herzklappen	Gehe zu: <ul style="list-style-type: none"> • Erkrankung kardio-vaskuläre • Transplantation
Hypercholesterinämie	Vorgehen: Löschen von "Ausschluss, wenn Symptome offensichtlich oder bei gleichzeitiger Herz-Kreislauf-Krankheit". Ergänzung von "Akzeptieren auch bei Behandlung. Akzeptieren wenn diese nicht mit einer Herzerkrankung, Vaskulären-Erkrankung oder anderen symptomatischen-Erkrankungen einhergeht." und "Siehe auch Erkrankungen, Kardio-vaskuläre"
Implantate	Vorgehen: Viren (Schreibfehler korrigiert).
Konjunktivitis (Bindehautentzündung)	Verweise: gelöscht Vorgehen: neu formatiert.



Malaria / Malariaregio- nen	<p>Vorgehen: Ergänzung von "Rückweisung für 4 Monate nach Rückkehr aus einem Endemiegebiet, falls ein Labortest für Malaria (IF oder ELISA) ein negatives Resultat ergibt."; «Rückweisung für mindestens 6 Monate nach Rückkehr aus einem Endemiegebiet, bei fehlender Malaria Testung.»</p> <p>«Ist das Resultat positiv gilt eine Rückweisung für 3 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist kann erneut ein Test durchgeführt werden. Ausschluss, im Falle dass der Test wiederum positiv ist. Ausschluss, falls kein Labortest durchgeführt wird.»</p> <p>Rückweisung für 3 Jahre, falls positiver Labortest. Nach Ablauf dieser Frist kann erneut ein Test durchgeführt werden. Ausschluss, falls positive Resultate.</p> <p>Ausschluss, falls kein Labortest.</p>
MSM	Gelöscht
Operation / Eingriff all- gemein	Gehe zu (gleiches Vorgehen): Augenlaserbehandlung gelöscht
Ovarialzyste	<p>Vorgehen: Löschen von "Rückweisung bis zur vollständigen Genesung". Ergänzung von "Akzeptieren bei normaler Nierenfunktion".</p> <p>Zu beachten: Assoziierte Krankheiten (polyzystische Nieren oder andere Krankheiten).</p>
Q-Fieber	Vorgehen: "Rückweisung von 2 Jahren, nach Genesung," statt "Ausschluss".
Sexuelle Kontakte, In- timpartner	<p>Vorgehen: Anpassung "Rückweisung für 4 Monaten, nach":</p> <ul style="list-style-type: none">• Sexualkontakt mit neuen Partnern Sexualkontakt mit einer neuen Partnerin bzw. einem neuen Partner. Eine "neue Partnerin bzw. einen neuen Partner" bedeutet:<ul style="list-style-type: none">- eine Person, mit der der Spender oder die Spenderin noch keinen Sexualkontakt hatte ODER- eine Person, mit der der Spender oder die Spenderin eine sexuelle Beziehung hatte, die beendet wurde, und mit der der Spender oder die Spenderin in den letzten 4 Monaten wieder Sexualkontakt aufnahm.• Rückkehr des Sexualpartners/-in, Sexualkontakt mit Partnern, die sich für 6 Monate oder länger in Ländern mit erhöhter HBV, HCV, HIV-Rate aufgehalten oder dort Bluttransfusionen erhalten haben (nach Rückkehr des Partners); <p>Rückweisung für 12 Monate nach letztem Sexualkontakt</p> <ul style="list-style-type: none">• Mit Partnern die in den letzten 4 Monaten Sexualkontakt mit mehr als 2 Personen hatten;• Unter Männern (MSM);• Für weibliche Personen mit MSM-Partnern;



Thalassaemie	Vorgehen: "heterozygoter Beta-Thalassaemie Träger" ersetzt mit "Träger einer Alpha- oder Beta-Thalassaemie minor". Zu beachten: Die klinische Manifestation und nicht die Genetik ist bestimmend.
---------------------	--

Vitrektomie	Verweise: "Gehe zu statt "siehe auch"
--------------------	---------------------------------------

Zahnoperation	Verweise: "Gehe zu" statt "siehe auch"
----------------------	--
