



## Spendetauglichkeitskriterien - Blutspende

### REFERENZEN

1. Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (AMBV) – aktuelle Version
2. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components - Council of Europe Press - aktuelle Version

### Dokumentation und allgemeine Grundsätze

Die Spendetauglichkeitskriterien sind eine Arbeitshilfe und haben zum Ziel, die Sicherheit von Spender und Empfänger zu gewährleisten. Sie gelangen bei allen homologen Blutspenden zur Anwendung.

Die Spendetauglichkeitskriterien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die Datei ist über die Website der B-CH AG zugänglich. Ergänzt wird diese Datei durch weitere Dokumente wie die „Medikamentenliste“, „Impfliste“, „Travelcheck Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken“ oder „spezifische Kriterien für die Durchführung der Blutspende“.

Die Kriterien werden unter Beachtung von europäisch verbindlichen Vorgaben regelmässig von der zuständigen Fachgruppe aktualisiert. Der medizinische Direktor setzt Änderungen in Kraft und kündigt diese an. Die elektronische Form auf der Website entspricht stets der aktuellen Version.

Die Spendetauglichkeit wird durch ausgebildetes Personal unter der Verantwortung eines Arztes des RBSD ermittelt. Zeigen sich bei der Befragung/Untersuchung Hinweise oder Befunde, welche die Spendetauglichkeit in Frage stellen, so müssen diese anhand der Kriterien interpretiert werden. Bei Rückweisung oder Ausschluss muss der Spender eine detaillierte Erklärung über den Grund der Rückweisung erhalten.

Wenn Zweifel über die Spendetauglichkeit bestehen oder ein gesundheitliches Risiko für Spender oder Empfänger vermutet oder erkannt wird, welches in den Kriterien nicht oder ungenügend beschrieben ist, entscheidet der Arzt des RBSD. Solche Situationen sind der Abteilung BSD der B-CH AG zu melden.

### In diesem Dokument verwendete Terminologie

Vorgehen	
<b>Ausschluss</b>	Zeitlich unlimitierte, nicht rückgängig zu machende Massnahme. Der Spender muss in einer für ihn verständlichen Form informiert werden.
<b>Rückweisung</b>	Zeitlich limitierte Massnahme. Der Spender muss wissen, wann und wie er wieder zugelassen wird.
<b>Akzeptieren</b>	Der Spender wird zum Blutspenden zugelassen.

Die Bezeichnung "Spender" gilt sowohl für Spenderinnen und Spender.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Abort</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung ab Abbruchdatum für Anzahl Monate der Schwangerschaft (Schwangerschaft vor Ende der 28. Woche).</p> <p>Rückweisung für 12 Monate, falls Schwangerschaftsabbruch im 3. Quartal (&gt; 28 Wochen).</p>
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Abszess</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung, bei Antibiotikabehandlung bis mindestens 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika.
<b>ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung)</b>	Vorgehen	Akzeptieren, auch unter Therapie mit Methylphenidat (z.B. Ritalin®).
<b>Affenpocken</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 21 Tage nach vollständiger Genesung</p> <p>Rückweisung für 21 Tage nach einem engen Kontakt (Intimpartner, Person aus demselben Haushalt), mit einer erkrankten Person.</p>
<b>AIDS</b>	Gehe zu	HIV
<b>Akne</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls Tetracyclin-/Erythromycinbehandlung oder Roaccutan® Gel.</p> <p>Rückweisung, wenn Läsionen aktiv oder infiziert sind.</p> <p>Rückweisung für 4 Wochen nach der letzten Dosis bei Anwendung von Isotretinoin (Curakne®, Isotretinoin, Roaccutan® Kapseln, Tretinac®), von Tretinoinum (Vesanoid®) oder Alitretinoin (Toctino®).</p> <p>Rückweisung für 2 Jahre nach der letzten Dosis von Etretinat (in der Schweiz aktuell nicht zugelassen).</p> <p>Rückweisung für 3 Jahre nach der letzten Dosis bei Anwendung von Acitretin (Acicutan®, Neotigason®).</p>
<b>Akupunktur</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate, falls Zweifel bezüglich steriler Arbeitstechnik oder Anzeichen für einen bakteriellen Infekt bestehen oder die Akupunktur nicht durch eine medizinische Fachperson mit Einwegnadel durchgeführt wurde.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Alkohol</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls unter Einfluss von Alkohol.
<b>Alkoholentwöhnung, akut</b>	Vorgehen	Rückweisung bis Abschluss der Therapie.
<b>Allergie</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls leichte Symptome mit oder ohne Behandlung.</p> <p>Rückweisung bei mittelgradigen, saisonalen Allergien bis nach Abklingen der Symptome.</p> <p>Ausschluss bei schwerwiegenden, chronischen Allergien. Bei Unklarheiten in der Bewertung ggf. Arzt des RBSD hinzuziehen.</p>
	Siehe auch	<p>Arzneimittelallergie</p> <p>Asthma</p> <p>Desensibilisierung, Allergie-</p> <p>Ekzem</p> <p>Heuschnupfen</p> <p>Nahrungsmittelallergie</p> <p>Urtikaria</p>

**Alter**                                      **Zu beachten**                                      Die Apherese Spender im Alter von 65-75 Jahren sollten zugelassen werden, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Erfahrene Spender
- Jährliche medizinische Freigabe grundsätzlich wie bei älteren VB Spendern. Insbesondere sollte die Freigabe von Apherese Spendern auf der Grundlage eines Interviews und/oder des standardisierten Fragebogens erfolgen, der nicht nur kardiovaskuläre Risiken, sondern auch zusätzliche Risiken für Osteoporose erfasst.

**Vorgehen**

Alter (Jahre)	Spendeart	Ärztlicher Entscheid	Fragebogen 558 «Spender über 65» oder gleichwertiger Fragebogen
18 - 65	Vollblut	-	-
18 - 65	Apherese	-	-
≥60	Erste Spende	x	-
≥ 60	Wechsel von Vollblut zur Apherese	x	-
65 - 75	Vollblut Mehrfachspender Apherese erfahrene Spender	x; jährlich wobei 4 Mal während einer Periode von 10 Jahren entweder ein persönliches Gespräch oder eine Beurteilung des Fragebogens 558 oder eines gleichwertigen Fragebogens durch den Arzt des RBSD durchgeführt werden muss.	x

**Alternative Medizin**                      Gehe zu                      Naturheilmedizin

**Amöbenruhr**                              Gehe zu                      Amöbiasis

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Anöbiasis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zum Verschwinden der klinischen Symptome und Ende der Behandlung, falls intestinal.  Rückweisung für 6 Monate nach Ende der Behandlung, falls viszeral.
<b>Anämie durch Eisenmangel</b>	Zu beachten	Spendefrequenz eventuell anpassen.
	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD.
	Siehe auch	Hämoglobin
<b>Anämie, durch Vit B12 oder Folsäuremangel</b>	Zu beachten	Die Ursache präzisieren.
	Vorgehen	Rückweisung bis Behandlungsabschluss, wenn die Reserven rekonstituiert sind.  Ausschluss bei chronischer Substitution.
<b>Anämie, Hämolytische</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Anämie, Sichelzellanämie</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Anästhesie, lokale</b>	Gehe zu	Narkose
<b>Anfälle</b>	Gehe zu	Epilepsie
<b>Angina pectoris</b>	Gehe zu	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Angststörung</b>	Gehe zu	Panikstörung
<b>Apoplexie</b>	Gehe zu	Erkrankung, Zerebro-vaskuläre
<b>Appendektomie</b>	Gehe zu	Blinddarmoperation

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Arrhythmien</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls nur atemabhängig.</p> <p>Akzeptieren bei Extrasystolen (VES oder SVES), falls asymptomatisch und nur sporadisch auftretend.</p> <p>Akzeptieren nach ablativer Therapie, wenn erfolgreich, kompensiert und ohne Medikamente.</p> <p>Ausschluss bei organischer Ursache.</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD bei ungeklärter Ursache.</p>
<b>Arthritis</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung bei akuter Form.</p> <p>Rückweisung bei Behandlung mit steroidalen Antirheumatika.</p> <p>Rückweisung für 12 Monate nach Absetzen einer Behandlung mit Methotrexat.</p> <p>Ausschluss bei schwerwiegender Erkrankung mit Behandlung.</p>
	Siehe auch	<p>Rheumatisches Fieber</p> <p>Spondylitis ankylosans</p>
<b>Arthrose</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls akute Phase.
<b>Arthroskopie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Arzneimittelallergie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate nach der letzten Reaktion auf das betreffende Arzneimittel.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Arzneimittelbehandlung</b>	Vorgehen	<p>Grundsätzliche Überlegungen zum Vorgehen bei Medikamenteneinnahme sind im Kapitel 17F aufgeführt. Dort findet sich auch eine Liste mit häufig verwendeten Medikamenten.</p> <p>In Kapitel 17F werden nur dann spezifische Rückweisungsfristen für verschiedene Medikamentengruppen aufgeführt, wenn es aufgrund des Medikaments selber einer Rückweisungsfrist bedarf, zum Beispiel bei teratogenen Medikamenten oder der Beeinflussung der Qualität der Blutprodukte (z.B. Thrombozytenaggregationshemmer).</p> <p>In allen anderen Fällen bestimmt die Grunderkrankung eine mögliche Rückweisungsdauer.</p> <p>Im Zweifelsfall Verweis auf Arzt des RBSD.</p>
	Siehe auch	Naturheilmedizin
<b>Asthma</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, wenn zum Zeitpunkt der Spende asymptomatisch und falls nur sporadische Anwendung von Inhalationsmitteln erforderlich bzw. bei regelmässiger präventiver Behandlung mit Inhalationsmitteln (inklusive Kortikosteroide).</p> <p>Rückweisung für 1 Monat nach akutem Anfall.</p> <p>Ausschluss, falls häufige Asthmaanfälle oder symptomatische chronische Krankheit trotz Steroid-Behandlung.</p>
<b>Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung</b>	Gehe zu	ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung)
<b>Augenarterienthrombose</b>	Definition	Verschluss von Arterien, was zu einer Minderdurchblutung der Netzhaut führt; es handelt sich um einen «Schlaganfall im Auge» oder Infarkt.
	Vorgehen	Ausschluss
<b>Augentumorentfernung</b>	Zu beachten	Alle Hirnhauteröffnungen bedingen Ausschluss.
	Vorgehen	Gehe zu Operation, Augen
<b>Augenvenenthrombose</b>	Definition	Verschluss von Venen, was zu einer Minderdurchblutung der Netzhaut führt.
	Vorgehen	Ausschluss.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Autoimmunkrankheit</b>	Vorgehen	Ausschluss, bei Multiorganerkrankung nach Abklärung durch den Arzt des RSBD und Bestätigung durch den Hausarzt.
	Siehe auch	Autoimmunthyreoiditis Guillain-Barré-Syndrom Spondylitis ankylosans Systemischer Lupus Erythematodes (SLE)
<b>Autoimmunthyreoiditis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und wenn der Spender frei von Symptomen ist.
<b>Babesiose</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Bänderriss</b>	Vorgehen	Akzeptieren ausser bei Operation vor weniger als einem Monat Im Zweifelsfall Verweis auf Arzt des RBSD.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein Operation, Knochen, Gelenke
<b>Bandwurm, Hund-, Fuchs-</b>	Gehe zu	Echinokokkose
<b>Basaliom</b>	Gehe zu	Krebs
<b>Bechterew-Krankheit</b>	Gehe zu	Spondylitis ankylosans
<b>Behinderte Spender, geistig</b>	Vorgehen	Ausschluss, wenn die medizinische Spendetauglichkeit nicht zuverlässig abgeklärt werden kann.
<b>Behinderte Spender, physisch</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn die der Behinderung zugrunde liegende Ursache die Blutspende verbietet und der Spender sich nicht auf die Liege begeben kann bzw. wenn Sicherheitsrisiken bestehen.
<b>Bell-Syndrom</b>	Gehe zu	Fazialis Lähmung, Periphere

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Bewusstlosigkeit</b>	Vorgehen	Ausschluss von Spendern, die bereits Blut gespendet haben und zweimal hintereinander ohnmächtig wurden. Im Zweifelsfall Verweis auf Arzt des RBSD.
<b>Bilharziose</b>	Vorgehen	Rückweisung für mindestens 12 Monate nach Ende der Behandlung und bis zum Nachweis einer ausgeheilten Schistosomiasis (Urin- und Stuhlprobe wiederholt negativ und abfallende oder negative Antikörper nach 12 und 24 Monaten).
<b>Bindehautentzündung</b>	Gehe zu	Konjunktivitis (Bindehautentzündung)
<b>Bipolare affektive Störung</b>	Definition	Früher manisch-depressive Erkrankung.
	Zu beachten	Immer psychisches Befinden und Belastbarkeit abklären.
	Vorgehen	Akzeptieren , wenn am Tag der Spende stabil. Kann der stabile Status nicht bestimmt werden, ist die Spendetauglichkeit durch den Arzt des RBSD zu beurteilen.
<b>Bissverletzung, Haus-/Wildtiere</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung. Tollwut wurde in der Schweiz und in umgrenzten Ländern ausgerottet. Problem nur bei Biss in Endemiegebieten zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall Rückweisung für 12 Monate.
	Siehe auch	Impfung
<b>Bissverletzung, Mensch</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate
<b>Blasenentzündung</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Blepharitis (Lidrandentzündung)</b>	Definition	Lidrandentzündung verschiedener Ursachen.
	Vorgehen	Gehe zu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chalazion (Hagelkorn)</li> <li>• Hordeolum (Gerstenkorn)</li> </ul>
<b>Blinddarmoperation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Blindheit</b>	Gehe zu	Sehbehinderung
<b>Blutdruck- Hoher / Hypertonie</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls fixierter Puls < 60/Min. und/oder systolischer Blutdruck < 120 mm Hg mit Betablocker.  Rückweisung, wenn Blutdruck entweder systolisch > 180 mm Hg oder diastolisch > 100 mm Hg beträgt.  Rückweisung nach Antihypertensiva-Behandlungsbeginn oder Medikamentenwechsel bis Blutdruck eingestellt ist.
	Siehe auch	Bradykardie
<b>Blutdruck- Niedriger</b>	Zu beachten	Effortil® darf nicht vor der Spende verabreicht werden.
	Vorgehen	Rückweisung, falls systolischer < 100 mm Hg und diastolischer Blutdruck < 50 mm Hg.  Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls systolischer BD < 120 mm Hg bei einem behandelten Patienten mit erhöhtem BD und/oder Schwindel ohne Ursache.
<b>Blutegelanwendung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate nach Blutegelanwendung.
<b>Blutkrankheiten, maligne</b>	Gehe zu	Krebs

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Bluttransfusion</b>	Definition	<p>Labile Blutprodukte: homologe Erythrozyten, Thrombozyten, frisch gefrorenes Plasma (FGP).</p> <p>Stabile Blutprodukte: Albumin, Immunglobulin und Gerinnungsfaktoren aus Plasma.</p> <p>Rekombinante Gerinnungsfaktoren: Gentechnisch hergestellte Produkte.</p>
	Zu beachten	Nach zugrunde liegender Krankheit fragen. Die Rückweisung nach Verabreichung von stabilen Blutprodukten ist mit dem Schweregrad der unterliegenden Krankheit verbunden.
	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls rekombinante Produkte, wenn keine zugrunde liegenden Krankheiten dies verbieten.</p> <p>Rückweisung für 12 Monate, falls stabile Blutprodukte verabreicht worden sind.</p> <p>Ausschluss, falls nach 1980 labile Blutprodukte verabreicht worden sind.</p> <p>Siehe Kap.17E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.</p>
	Siehe auch	<p>Operation / Eingriff allgemein</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p>
<b>Boeck-Krankheit</b>	Gehe zu	Sarkoidose
<b>Borreliose</b>	Siehe auch	<p>Lyme-Krankheit</p> <p>Zeckenstich</p>
<b>Bradykardie</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls Normalisierung bei 2. Blutdruckmessung (ev. nach Essen) oder wenn der Spender Sportler ist oder eine körperliche Arbeit ausführt und keine Nebenwirkung aufweist.</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls Herzfrequenz unter 50 und nicht durch Medikamente bedingt.</p>
	Siehe auch	Blutdruck- Hoher / Hypertonie
<b>Bronchitis akute</b>	Vorgehen	Rückweisung für mindestens 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung und nach vollständiger Genesung.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Bronchitis chronische</b>	Vorgehen	Ausschluss, wenn der Spender jeden Winter wiederholte, regelmässige Anfälle mit Husten und Sputumabsonderung hat.
<b>Brucellose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach Einnahme von verdächtigen Nahrungsmitteln. Ausschluss, falls bestätigte Infektion.
<b>Brust, Knoten, Biopsie</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn Zweifel in Bezug auf die Diagnose, bis zum Erhalt weiterer Auskünfte. Rückweisung für 1 Monat, falls Entfernung eines gutartigen Knotens aus der Brust und bis zur vollständigen Genesung. Bei maligner Erkrankung ist das gleiche Vorgehen anzuwenden, wie beim Kriterium «Krebs».
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Brustfellentzündung</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung. Ausschluss, falls maligner Prozess.
<b>Candidamykose</b>	Gehe zu	Soor
<b>Cannabidiol</b>	Vorgehen	Akzeptieren
<b>Cannabis</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls unter Einfluss von Cannabis.
	Siehe auch	Drogengebrauch

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Chagas-Krankheit</b>	Zu beachten	<p>Folgende Spender dürfen erst nach negativem Labortest für Chagas (IF oder ELISA) wieder zugelassen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn in Endemiegebiet geboren und/oder aufgewachsen;</li> <li>• Wenn Mutter aus einem Endemiegebiet;</li> <li>• Wenn ununterbrochener Aufenthalt von mehr als 6 Monaten in einem Chagas-Endemiegebiet.</li> </ul>
	Vorgehen	<p>Akzeptieren falls Aufenthalt in endemischem Gebiet &lt; als 6 Monate.</p> <p>Ausschluss bei Erkrankung oder bestätigt positivem anti-T.cruzi-Labortest.</p> <p>Siehe Kap.17E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.</p>
<b>Chalazion (Hagelkorn)</b>	Definition	Nicht infektiöse Obstruktion einer Meibom-Drüse (Talgdrüse am Rand der Augenlider)
	Vorgehen	Akzeptieren
<b>Chikungunya</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 1 Monat nach Aufenthalt in endemischem Gebiet.</p> <p>Rückweisung für 4 Monate nach vollständiger Genesung.</p> <p>Siehe Kap.17E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.</p>
<b>Chlamydia</b>	Zu beachten	Anamnestisch andere sexuell übertragbaren Krankheiten und stabile Partnerschaft erfragen.
	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Behandlung und vollständiger Genesung.
	Siehe auch	Risikosituationen
<b>Cholera</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach Genesung.
<b>Cholera, Kontakt</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Woche nach Rückkehr aus Endemiegebiet.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Cholezystektomie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Gallensteine Operation / Eingriff allgemein
<b>Cholezystitis</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika-Behandlung und Verschwinden der Symptome.
	Siehe auch	Cholezystektomie Gallensteine
<b>Claudicatio intermittens</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Cocain</b>	Gehe zu	Drogengebrauch
<b>Colitis</b>	Gehe zu	Durchfallerkrankung
<b>Colitis ulcerosa</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Colon irritabile</b>	Gehe zu	Reizdarm
<b>Covid-19</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen, nach vollständiger Genesung. Falls nach 14 Tagen eine persistierende Ageusie, Anosmie (Geruchs- oder Geschmacksverlust) und / oder ein trockener Husten besteht, wird der Spender zugelassen.
	Siehe auch	Rückweisung für 2 Wochen bei positivem Covid-Test und asymptomatischen Verlauf (der Testtag gilt als Stichdatum). Erkältung Grippe, Kontakt

<b>Creutzfeldt-Jakob-Krankheit</b>	Vorgehen	Ausschluss wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Spender transplantiert (Hirnhaut-, Hornhauttransplantation) worden ist,</li> <li>• mit Hypophysenhormonen menschlicher Herkunft behandelt worden ist,</li> <li>• Blutsverwandte des Spenders erkrankt sind oder waren,</li> <li>• der Spender zwischen 1.1.1980 und 31.12.1996 für insgesamt 6 Monate oder länger im Vereinigten Königreich (UK) (England, Wales, Schottland, Nordirland, Isle of Man, Kanalinseln, Gibraltar, Falklandinseln) gewohnt hat/gereist ist (erhöhte Inzidenz der vCJD),</li> <li>• der Spender nach 1980 Blutprodukte erhalten hat.</li> </ul>
	Siehe auch	Bluttransfusion Hornhaut, Transplantation Wachstumsstörung
<b>Cushing-Syndrom</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Dengue Fieber</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Rückkehr aus Risikogebiet. Rückweisung für 4 Monate nach vollständiger Genesung, falls nicht hämorrhagisch. Siehe Kapitel 17 E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.
<b>Depression</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn nur Tabletten eingenommen werden und bei stabilem Verlauf. Rückweisung für 1 Woche nach der letzten Einnahme von Lithium (teratogenes Medikament).
<b>Dermatitis</b>	Gehe zu	Hautentzündung
<b>Desensibilisierung, Allergie-</b>	Vorgehen	Rückweisung für 48 Stunden nach der letzten Injektion.
	Siehe auch	Allergie

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Diabetes insipidus</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Diabetes mellitus</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, wenn unter diätetischer Behandlung mit oder ohne orale Antidiabetika, gut kontrolliert.</p> <p>Rückweisung, falls instabil.</p> <p>Ausschluss, wenn unter Insulinbehandlung oder andere parenterale Medikamente.</p>
<b>Diphtherie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Genesung.
<b>Diskushernie</b>	Vorgehen	Akzeptieren ohne Operation.
<b>Diskushernie, Operation</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 6 bis 12 Monate nach der Operation (nach Ermessen des Arztes des RBSD) bei Spinalkanalerweiterung oder Spondylodese/Aufrichteoperation.</p> <p>Rückweisung für 3 Monate bei minimal invasivem Prozedere/Hemilaminektomie.</p>
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Divertikulitis</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach Absetzen der Behandlung.
<b>Divertikulose</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls Symptome.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Drogengebrauch</b>	Zu beachten	Die frühere Anwendung nicht-parenteraler Drogen erfordert nicht unbedingt eine Rückweisung; es ist jedoch zu bedenken, dass die von solchen Spendern in Bezug auf den Drogenkonsum erzählte Beschreibung nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss und möglicherweise auf ein Risiko einer HIV-, HBV-, HCV-Infektion hindeuten kann.
	Vorgehen	Rückweisung von Spendern unter Drogeneinfluss, auch wenn Drogen "nur" peroral angewendet werden. Ausschluss, falls jemals Drogen injiziert wurden.
	Siehe auch	Risikosituationen Sexualverkehr unter dem Einfluss von synthetischen Drogen; Chem-Sex Sexuelle Kontakte, Intimpartner
<b>Dry Needling</b>	Gehe zu	Akupunktur
<b>Duodenalulkus</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn vor kurzem Symptome aufgetreten sind und der Patient unter Behandlung steht.
	Siehe auch	Gastrektomie
<b>Dura-mater, Operation/Transplantation</b>	Gehe zu	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
<b>Durchfallerkrankung</b>	Zu beachten	Nach der Frequenz und Dauer der Durchfälle befragen (einmalig, chronisch, etc.).
	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach vollständiger Genesung und Absetzen der Behandlung (ausser bei chronischer entzündlichen Darmkrankheit).
	Siehe auch	Colitis ulcerosa Gastroenteritis, Kontakt Morbus-Crohn Reizdarm Shigellose Typhus
<b>Ebola</b>	Gehe zu	Hämorrhagisches virales Fieber

<b>Echinokokkose</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Eileiterentzündung</b>	Gehe zu	Salpingitis
<b>Ekzem</b>	Vorgehen	Akzeptieren, vorausgesetzt dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der betroffene Bereich flächenmässig klein ist,</li> <li>• die Einstichstelle läSIONsfrei ist,</li> <li>• und nur eine Lokalbehandlung appliziert wird.</li> </ul> Rückweisung, falls offene Hautstellen.
	Siehe auch	Allergie
<b>Emphysem</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Endometriose</b>	Vorgehen	Rückweisung, nur falls Symptome.
<b>Endoskopie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate nach Endoskopie mit flexiblen Instrumenten.
<b>Enzephalitis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Zeckenzephalitis (FSME)
<b>Epilepsie</b>	Zu beachten	Manche Epileptiker reagieren auch auf geringfügigen Stress mit Anfällen. Es ist wichtig, zusätzliche Risiken zu vermeiden.
	Vorgehen	Rückweisung von Personen unter regelmässiger Antiepileptikabehandlung.  Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls keine Antiepileptikatherapie während der letzten 3 Jahre und keine Anfälle.
	Siehe auch	Kopfverletzung
<b>Epilierung, elektrische</b>	Gehe zu	Akupunktur

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Erkältung</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach Abklingen des Fiebers, falls Fieber &gt; 38° C.</p>
	Siehe auch	Fieber
<b>Erkrankung, Atemwege</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls chronische Lungenkrankheit (COPD) ohne Komplikation (keine Infektion, Asthma, Polyglobulie).</p> <p>Ausschluss, falls gravierende Atemwegerkrankung und chronisches Problem, das eine regelmässige und langfristige Einnahme von Steroiden nötig macht.</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls akutes Problem.</p>
	Vorgehen	<p>Rückweisung für 2 Wochen bei Entzündungen.</p> <p>Rückweisung für 1 Monat bei Operationen.</p>
<b>Erkrankung, Augen</b>	Siehe auch	<p>Augenarterienthrombose</p> <p>Augenvenenthrombose</p> <p>Chalazion (Hagelkorn)</p> <p>Glaukom (Grüner Star)</p> <p>Hordeolum (Gerstenkorn)</p> <p>Katarakt (Grauer Star)</p> <p>Keratitis (Hornhautentzündung)</p> <p>Konjunktivitis allergisch</p> <p>Konjunktivitis infektiös</p> <p>Maculadegeneration (AMD)</p> <p>Netzhautablösung (ablatio retinae)</p> <p>Retinopathia Pigmentosa</p> <p>Uveitis</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Erkrankung, Haut</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren bei Hauterscheinungen einer Krankheit mit genetischer Empfänglichkeit (Neurodermatose, Psoriasis, Ekzem, etc.), falls die Haut an der Venenpunktionsstelle gesund ist und der Spender nicht mit potentiell teratogenen Medikamenten behandelt wird.</p> <p>Rückweisung je nach Ursache, falls generalisierte Hautkrankheit.</p>
	Siehe auch	<p>Ekzem</p> <p>Lyme-Krankheit</p> <p>Psoriasis</p> <p>Verletzung</p>
<b>Erkrankung, Kardio-vaskuläre</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls kongenital z. B. komplikationslos operierte Herzvitien, symptomfrei und keine Endokarditis-Prophylaxe erforderlich.</p> <p>Akzeptieren bei Mitralklappenprolaps.</p> <p>Ausschluss, insbesondere bei Angina pectoris, Herzinfarkt, schweren organisch bedingten Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, Herzschrittmacher, Status nach Herzoperationen (Bypass), Patienten unter Endokarditis-Prophylaxe, Status nach Stent/Laser, arteriellen Gefässverschlüssen, Claudicatio intermittens, Gefässaneurysmata, Mitralklappenstenose (rheumatische Herzkrankheit), pulmonale Hypertonie, Herzinsuffizienz.</p>
	Vorgehen	<p>Ausschluss von allen Krankheiten, die eine immunologische Ursache haben können (z.B. Morbus Crohn, Collitis ulcerosa) oder die den Betreffenden infolge einer gestörten Eisenresorption oder infolge von Blutverlusten für Eisenmangel anfällig machen.</p>
<b>Erkrankung, Magen, Darm</b>	Vorgehen	<p>Ausschluss von allen Krankheiten, die eine immunologische Ursache haben können (z.B. Morbus Crohn, Collitis ulcerosa) oder die den Betreffenden infolge einer gestörten Eisenresorption oder infolge von Blutverlusten für Eisenmangel anfällig machen.</p>
	Siehe auch	Durchfallerkrankung
<b>Erkrankung, Zerebro-vaskuläre</b>	Vorgehen	<p>Ausschluss bei Hirnschlag/Apoplexie, Status nach Stent/Laser, arteriellen Gefässverschlüssen, Gefässaneurysmata, falls Folge einer zerebralen Minderdurchblutung, insbesondere bei Lähmungserscheinungen: Halbseitenlähmung (zerebrovaskulärer Insult), Streifung / transitorischer ischämischer Attacke (TIA).</p>
	Siehe auch	Hörsturz

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Erkrankungen, Psychiatrische</b>	Siehe auch	Bipolare affektive Störung Depression Panikstörung Psychose, akut Psychose, nicht akut Schizophrenie
<b>Erysipel</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung.
<b>Faktor V Leiden Genmutation</b>	Siehe auch	Gerinnungsstörung Lungenembolie Thrombose, Arterien Thrombose, Venen oberflächlich Thrombose, Venen tief
<b>Fazialis Lähmung, Periphere</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung, falls infektiöse Ursachen (Herpes zoster, andere bakterielle oder virale Infekte) und/oder dem Spender eine Kortikotherapie verabreicht wurde.
<b>Fehlgeburt</b>	Gehe zu	Abort
<b>Fibroadenom der Brust, Entfernung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Fibromyalgie</b>	Gehe zu	Autoimmunkrankheit
<b>Fieber</b>	Definition	Fieber > 38 °C
	Zu beachten	Wenn möglich, Ursache ermitteln. Spender nach Reisen ins Ausland, besonders in tropische Regionen, befragen.
	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach Abklingen der Symptome.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Filariose</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Furunkel</b>	Gehe zu	Abszess
<b>G6PD-Mangel</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Gallenblase, Operation</b>	Gehe zu	Cholezystektomie
<b>Gallenblasenentzündung</b>	Gehe zu	Cholezystitis
<b>Gallensteine</b>	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls nicht symptomfrei.
	Siehe auch	Cholezystitis
<b>Gastrektomie</b>	Definition	mit/ohne Duodenektomie.
	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach der Operation, falls partielle Gastrektomie.  Rückweisung für 12 Monate nach Operation wegen peptischer Ulzera (Geschwüre).
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein Operation, viszerale
<b>Gastritis</b>	Vorgehen	Akzeptieren, falls chronische, leichte Oberbauchbeschwerden, die durch regelmässige oder sporadische Einnahme von Antazida oder Protonenpumpenhemmer gelindert werden.  Rückweisung, wenn Antazida oder Protonenpumpenhemmer die Gastritis nicht lindern.  Rückweisung für 1 Monat nach Abklingen der Symptome, falls akute Phase.
<b>Gastroenteritis</b>	Gehe zu	Durchfallerkrankung

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Gastroenteritis, Kontakt</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Woche nach dem Kontakt.
<b>Gebärmutterentfernung</b>	Gehe zu	Hysterektomie
<b>Gebärmuttersenkung, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Gefährliche Berufe und Hobbies</b>	Definition	Gefährliche Berufe: z. B. Lokomotivführer, LKW- oder Busfahrer, Piloten, Personen, die schwere Maschinen bedienen, auf Leitern oder Gerüste klettern, Kranführer, Taucher. Gefährliche Hobbies: z. B. Tiefseetauchen, Klettern, Gleitschirmfliegen, Segel- und Motorflug, Auto- oder Motorradrennen.
	Vorgehen	Nach dem Blutspenden muss eine Wartezeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden, bevor Tätigkeiten/Hobbies oder Berufen ausgeübt werden können, die den Blutspender selbst oder andere gefährden können. Die Einhaltung von Beruf- oder Hobby-spezifischen Vorgaben liegt in der Verantwortung des Spenders.  Physische Anstrengungen am Tag der Blutspende vermeiden.
<b>Gelbfieber</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung.
<b>Gelbfieber, Kontakt</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach dem Kontakt.
<b>Gelbsucht</b>	Vorgehen	Akzeptieren bei folgender Anamnese: Neugeborenenhämolyse, Gallensteine, angeborene nicht infektiöse Gelbsucht (Gilbert-Meulengracht Krankheit), dokumentierte andere, nicht infektiöse Ursache (Vergiftung, Medikamente).
	Siehe auch	Gallensteine Gilbert-Meulengracht Syndrom Hepatitis, unklare Anamnese

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Gelenkentzündung</b>	Gehe zu	Arthritis
<b>Gelenkverrenkung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Woche nach Unfall.
<b>Gerinnungsfaktor-Konzentrate</b>	Siehe auch	Bluttransfusion Hämophilie A und B
<b>Gerinnungsstörung</b>	Definition	Blutungsneigung und Thrombophilie
	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls Hämophilie-Carrier-Status (ohne andere Ausschlussgründe) ohne Symptomatik.</p> <p>Akzeptieren, falls labordiagnostisch Faktor V Leiden (APC-Resistenz), Faktor II-Anomalie, Protein C und S-Mangel, Antithrombin III-Mangel, Homocystein / Antiphospholipid-Antikörper, jeweils wenn ohne Medikation, ohne Thromboseereignis und ohne andere Symptomatik</p> <p>Rückweisung für 3 Monate nach der letzten Einnahme von Cumarinderivaten (teratogen).</p> <p>Im Zweifelsfall Verweis auf Arzt des RBSD.</p>
	Siehe auch	Bluttransfusion Hämophilie A und B Idiopatische Thrombozytopenische Purpura (ITP) Lungenembolie Thrombose, Arterien Thrombose, Venen oberflächlich Thrombose, Venen tief
<b>Gerstenkorn</b>	Gehe zu	Hordeolum (Gerstenkorn)
<b>Gewicht</b>	Vorgehen	Ausschluss, falls < 50 Kg.
<b>Gewichtsreduktion, operativ</b>	Gehe zu	Operation, viszerale

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Gicht</b>	Vorgehen	Akzeptieren, falls leichte Gicht selbst unter Allopurinolbehandlung.  Rückweisung für 2 Wochen, falls akuter Schub, nach Abklingen der Symptome und vollständiger Genesung.
<b>Gilbert-Meulengracht Syndrom</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls ikterisch.
	Siehe auch	Gelbsucht
<b>Glaukom (Grüner Star)</b>	Definition	Schädigung des Sehnervs durch Druckanstieg im Auge.
	Vorgehen	Akzeptieren bei Behandlung ausschliesslich mit Augentropfen oder Anwendung von Betablockern und bestätigter Pulsrate > 60/Min. und Blutdruck > 120/60 mm Hg.  Rückweisung bei allen anderen Behandlungen bis Behandlungsende.
	Siehe auch	Glaukom Operation
<b>Glaukom Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein Operation, Augen
<b>Glomerulonephritis</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate nach Genesung.
<b>Glutenintoleranz</b>	Gehe zu	Zöliakie
<b>Gonorrhö</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate nach Behandlungsende des Spenders und des allfälligen Sexualpartners.
<b>Grauer Star</b>	Gehe zu	Katarakt (Grauer Star)
<b>Grauer Star, Operation</b>	Gehe zu	Katarakt Operation
<b>Grippe</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach Genesung.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Grippe, Kontakt</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach Kontakt mit der erkrankten Person.
<b>Grüner Star</b>	Gehe zu	Glaukom (Grüner Star)
<b>Guillain-Barré-Syndrom</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre bei typischem monophasischem Guillain-Barré-Syndrom ohne Wiederauftreten der Symptome, vom Hausarzt bestätigt und innerhalb eines Jahres vollständig geheilt.
<b>Gürtelrose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Erholung (Hautläsionen trocken).
<b>Haarausfall</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Wochen nach Absetzen der Behandlung mit Alocapil®, Finacpil®, Finasterid® oder Propecia®.
<b>Hagelkorn</b>	Gehe zu	Chalazion (Hagelkorn)
<b>Hämochromatose</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls lediglich genetische Veranlagung ohne Eisenüberladung.</p> <p>Akzeptieren, falls genetische Veranlagung mit Diagnose einer Hämochromatose, aber ohne relevante Organbeteiligung (ausgenommen Arthropathie). Status nach Aderlassbehandlung möglich. Ferritin nicht erhöht.</p> <p>Die Spendefrequenz kann bei Männern 6 x pro Jahr und Frauen 4 x pro Jahr betragen. Das Spendeintervall von 10 Wochen kann unterschritten werden.</p> <p>Ausschluss, falls Organschaden (ausgenommen Arthropathie) und Aderlassbehandlung.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Hämoglobin</b>	Vorgehen	Akzeptieren von tieferen Werten im Einzelfall möglich nach Absprache mit dem Arzt des RBSD. Akzeptieren für Vollblutspende, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen <math>\geq 125</math> g/l</li> <li>• Männer <math>\geq 135</math> g/l</li> </ul> Akzeptieren für Apheresespende, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen <math>\geq 110</math> g/l</li> <li>• Männer <math>\geq 120</math> g/l</li> </ul> Rückweisung, falls <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen <math>&gt; 190</math> g/l</li> <li>• Männer <math>&gt; 200</math> g/l.</li> </ul>
<b>Hämoglobinopathien</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Hämoglobinstörung, genetische</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Hämophilie A und B</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn Hämophilie-Carrier-Status (ohne andere Risikofaktoren). Ausschluss in allen anderen Fällen.
	Siehe auch	Bluttransfusion Gerinnungsstörung
<b>Hämorrhagisches virales Fieber</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate nach Genesung, falls Lassa, Marburg, Krim-Kongo. Ausschluss nach durchgemachter Ebola-Infektion
	Siehe auch	Dengue Fieber
<b>Hämorrhagisches virales Fieber, Kontakt</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Rückkehr.
<b>Hämorrhoiden</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn regelmässige oder starke Blutungen.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Hämorrhoiden, Behandlung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Exzision.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Handwurzelkanal, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Harnwegsinfekte</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.  Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls wiederholte Urethritis.
<b>Haschisch</b>	Gehe zu	Cannabis
<b>Hashimoto-Thyreoiditis</b>	Gehe zu	Autoimmunthyreoiditis
<b>Hautabszess</b>	Gehe zu	Abszess
<b>Hautentzündung</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn die Läsionsfläche klein ist, die Behandlung nur lokal ist (z. B. Salbe, Creme, Schaum) und die Einstichstelle nicht betroffen ist.
<b>Hautkrebs</b>	Gehe zu	Krebs
<b>Hautverletzung</b>	Siehe auch	Kontakt mit Fremdblut Piercing Tätowierung Verletzung
<b>Hepatitis A</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Hepatitis B</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 4 Monate nach Aufenthalt in Ländern mit erhöhter HBV-Rate für 6 Monate oder länger.</p> <p>Ausschluss, falls HBsAG und/ oder HBV NAT und/ oder Anti-HBc positiv. Siehe Kap. 21 „Algorithmen zur HBV/ HCV/ HIV Diagnostik“.</p> <p>Die Kriterien gemäss Kap 17D: „Vaccine Check - Impfcheck“ müssen erfüllt sein.</p>
	Siehe auch	<p>Hepatitis B, Haushaltskontakt</p> <p>Hepatitis B, Sexualpartner</p> <p>Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p>
<b>Hepatitis B, Haushaltskontakt</b>	Definition	Wohnpartner
	Vorgehen	<p>Rückweisung vom Spender bei weiterhin bestehendem Haushaltskontakt.</p> <p>Rückweisung für 6 Monate, wenn der Spender einen Wohnpartner mit nachgewiesener HBV-Infektion hatte, falls seither kein Kontakt mehr stattgefunden hat, zusätzliche Entnahme einer diagnostischen Blutprobe (Anti-HBc).</p>
	Siehe auch	<p>Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p>
<b>Hepatitis B, Sexualpartner</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 6 Monate, wenn der Spender einen Sexualpartner mit nachgewiesener HBV Infektion hatte, falls seither kein Kontakt mehr stattgefunden hat, zusätzliche Entnahme einer diagnostischen Blutprobe (Anti-HBc).</p> <p>Ausschluss vom Spender bei weiterhin bestehendem Kontakt.</p>
	Siehe auch	<p>Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p>
<b>Hepatitis C</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 4 Monate nach Aufenthalt in Ländern mit erhöhter HCV-Rate für 6 Monate oder länger.</p> <p>Ausschluss, falls HCV-Ak und/oder HCV NAT positiv.</p>
	Siehe auch	<p>Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p>

<b>Hepatitis C, Sexualpartner</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 6 Monate, wenn der Spender einen Sexualpartner mit nachgewiesener HCV Infektion hatte, falls seither kein Kontakt mehr stattgefunden hat.</p> <p>Ausschluss vom Spender bei weiterhin bestehendem Kontakt.</p>
	Siehe auch	Sexuelle Kontakte, Intimpartner

<b>Hepatitis E</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate
--------------------	----------	--------------------------

<b>Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren von Spitalpersonal, das Patienten mit Hepatitis betreut oder in Krankenhauslabors arbeitet, vorausgesetzt, dass die Betreffenden keine Stichverletzung mit Blutkontamination haben.</p> <p>Rückweisung für 4 Monate nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tätowierung;</li> <li>• Semi-permanentem Make-up;</li> <li>• Endoskopie mit flexiblen Instrumenten;</li> <li>• Kontakt mit Fremdblut (Nadelstichverletzung oder Blutkontakt mit Schleimhaut oder verletzter Haut);</li> </ul> <p>Rückweisung für 6 Monate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach letztem engem Haushaltskontakt mit Wohnpartner/in mit HBV.</li> </ul> <p>Rückweisung für 12 Monate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spender, die nach einer Stichverletzung Hepatitis-B-Ig erhalten haben</li> </ul>
	Siehe auch	<p>Akupunktur</p> <p>Endoskopie</p> <p>Hepatitis B, Haushaltskontakt</p> <p>Hepatitis B, Sexualpartner</p> <p>Hepatitis C, Sexualpartner</p> <p>Kontakt mit Fremdblut</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p> <p>Spitalpersonal</p> <p>Tätowierung</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Hepatitis, unklare Anamnese</b>	Zu beachten  Siehe auch	Bei unklarer Hepatitis Anamnese nur Entnahme einer diagnostische Blutprobe.  Hepatitis B Hepatitis C
<b>Herkunft aus Ländern mit einer erhöhten HIV, HBV, HCV-Rate</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate nach Ankunft in der Schweiz. Siehe Kapitel 17 E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken
<b>Heroin</b>	Gehe zu	Drogengebrauch
<b>Herpes genitalis</b>	Vorgehen	Rückweisung, bis die Läsionen abgeheilt sind und bis 2 Wochen nach Absetzen der Behandlung, vorausgesetzt, es liegen anamnestisch keine anderen sexuell übertragbaren Krankheiten vor (z. B. Chlamydia).  Rückweisung für 2 Wochen nach Sexualkontakt oder Ausheilung des regelmässigen Sexualpartners.
<b>Herpes labialis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis Genesung der Läsionen.
<b>Herpes Zoster</b>	Gehe zu	Gürtelrose
<b>Herzgeräusche</b>	Vorgehen	Akzeptieren, falls asymptomatisch, lageabhängig und leise bis 2/6. Alle übrigen Herzgeräusche müssen beim Hausarzt abgeklärt werden.  Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD.
<b>Herzinfarkt</b>	Gehe zu	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Herzinsuffizienz</b>	Gehe zu	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Herzklappen</b>	Vorgehen	Gehe zu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erkrankung kardio-vaskuläre</li> <li>• Transplantation</li> </ul>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Herzschríttmacher</b>	Gehe zu	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Herzvitien</b>	Gehe zu	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Heuschnupfen</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls schwerwiegende Symptome während der Pollensaison.
	Siehe auch	Allergie
<b>Hiatushernie, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach der Operation, falls komplikationsfrei.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Hirndurchblutungsstörung</b>	Gehe zu	Erkrankung, Zerebro-vaskuläre
<b>Hirnerschütterung</b>	Gehe zu	Kopfverletzung
<b>Hirnhauttransplantation</b>	Gehe zu	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
<b>Hirnschlag</b>	Gehe zu	Erkrankung, Zerebro-vaskuläre

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>HIV</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 4 Monate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Aufenthalt in Ländern mit erhöhter HIV-Rate für 6 Monate oder länger.</li> </ul> <p>Ausschluss bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nachgewiesener HIV Infektion;</li> <li>Injektion von Drogen (früher oder gegenwärtig).</li> </ul> <p>Siehe "Informationsblatt für BlutspenderInnen".</p> <p>Siehe Kapitel 17 E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.</p>
	Siehe auch	<p>Prostitution, Sexworker</p> <p>Sexualverkehr unter dem Einfluss von synthetischen Drogen; Chem-Sex</p> <p>Sexuelle Kontakte, Intimpartner</p>
<b>HIV Intimpartner</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 12 Monate</p> <p>ab dem letzten sexuellen Kontakt mit einem Partner mit nachgewiesener HIV-Infektion.</p> <p>Ausschluss</p> <p>vom Spender bei weiterhin bestehendem Kontakt.</p>
<b>Hordeolum (Gerstenkorn)</b>	Definition	Infektiöse und schmerzhafte Lidrandentzündung, i.d. Regel bakteriell
	Vorgehen	Rückweisung 2 Wochen nach vollständiger Genesung und Abschluss der Therapie
<b>Hormonspirale</b>	Gehe zu	Spirale
<b>Hormonsubstitutionstherapie</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls Behandlung von Menopauseschwerden oder von Osteoporose mit Hormonpräparaten.</p> <p>Ausschluss nach Behandlung mit Gonadotropinen (Hormonen zur Behebung von Unfruchtbarkeit) aus Hypophysen.</p>
<b>Hornhaut, Transplantation</b>	Vorgehen	Ausschluss.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Hornhautentzündung</b>	Gehe zu	Keratitis (Hornhautentzündung)
<b>Hörsturz</b>	Vorgehen	Akzeptieren bei Knalltrauma. Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD in allen anderen Fällen.
<b>Horton-Magath-Syndrom</b>	Gehe zu	Temporalarteritis
<b>HTLV I/II</b>	Definition	Humanes T-lymphotropes Virus I / II
	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Hüft- Knie Prothese</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 bis 12 Monate nach der Operation, nach Ermessen des Arzts des RBSD.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Huntington-Chorea</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Hypercholesterinämie</b>	Vorgehen	Akzeptieren auch bei Behandlung. Akzeptieren wenn diese nicht mit einer Herzerkrankung, Vaskulären-Erkrankung oder anderen symptomatischen Erkrankungen einhergeht.
	Siehe auch	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Hyperthyreose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach Thyreoidektomie oder Radiojodtherapie. Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls Behandlung mit Thyreostatika (z. B. Neo-mercazole).
	Siehe auch	Autoimmunthyreoiditis

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Hypothyreose</b>	Zu beachten	Nach Komplikationen, z. B. Angina pectoris, fragen.
	Vorgehen	Akzeptieren, wenn unter Substitutionstherapie gut eingestellt und asymptomatisch.
	Siehe auch	Autoimmunthyreoiditis
<b>Hysterektomie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat bis 3 Monate, falls gutartig; je nach Eingriff und Komplikationen, vom Arzt des RBSD zu beurteilen.
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Idiopathische Thrombozytopenische Purpura (ITP)</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn mindestens 1 Jahr in Remission, ohne Medikation und Thrombozyten in normalem Bereich.  Akzeptieren, falls anamnestisch ITP in der Kindheit. Ausschluss in allen andern Fällen.
	Siehe auch	Bluttransfusion Operation / Eingriff allgemein
<b>Ikterus</b>	Gehe zu	Gelbsucht
<b>Ileostoma</b>	Vorgehen	Ausschluss.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Immunobiotherapie</b>	Vorgehen	Akzeptieren bei bakteriellen Präparaten (z. B. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccalin®, Luivac®, Ribomunyl®), falls keine chronische Grunderkrankung oder rezidivierende Infektion vorliegt.  Rückweisung für 12 Monate nach Absetzen von Serotherapie/Immunobiotherapie mit Präparaten menschlichen Ursprungs (z. B. Cytotect®, Hepatect®, Tollwut- und Tetanus-Passivimpfstoff, Varitect®).  Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD nach Behandlung mit Präparaten tierischen Ursprungs/Zelltherapie (z. B. Präparate bovinen Ursprungs wie früher Solcoseryl®).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Implanon®</b>	Vorgehen	Rückweisung für 72 Stunden (ohne Zeichen von Hautentzündung).
<b>Implantate</b>	Vorgehen	<p>Zugelassene sind zahnchirurgische Implantate wie Cerabone®, Bio-Oss®, Bio-Oss Collagen® und Bio-Gide®.</p> <p>Bei anderen, nicht aufgelisteten Implantaten, für deren Herstellung Gewebe oder Zellen menschlichen oder tierischen Ursprungs oder ihre Derivate verwendet werden, ist die Spendetauglichkeit nur gegeben, wenn das EG-Zertifikat und die EG-Konformitätserklärung des Implantates nach der neuen Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) ausgestellt worden sind.</p> <p>Implantate mit EG-Zertifikaten nach der alten Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG (MDD) können im Ermessen des ärztlichen Dienstes zugelassen werden, wenn der Hersteller dem RBSD schriftlich bestätigt, dass aufgrund der Herkunft der Ausgangsmaterialien und der Herstellverfahren dieser Produkte die Abwesenheit von Erregern (inkl. Viren und Prionen) übertragbarer Krankheiten gewährleistet ist.</p> <p>Die EG-Zertifikate müssen minimal, bezüglich der Richtigkeit, auf folgenden Punkte überprüft werden: Richtlinie/Verordnung, Gültigkeitsdauer/Ablaufdatum des Zertifikates, Herstellername und Produktbezeichnung.</p>
	Siehe auch	Zahnbehandlung
<b>Infektionskrankheit, Kontakt</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren nach Impfung oder vorheriger Krankheit.</p> <p>Rückweisung für 4 Wochen nach dem Kontakt oder falls unbekannte Inkubationszeit.</p> <p>Siehe spezifisches Stichwort.</p>
	Siehe auch	Kontakt mit Fremdblut
<b>Infektiöse Hepatitis nicht objektiv nachweisbar</b>	Vorgehen	Ausschluss und Spender ohne nachweisbare Hepatitis-Marker informieren, wenn aufgrund von Blutspenden bei 2 verschiedenen Patienten der starke Verdacht einer durch Transfusion übertragenen Hepatitis besteht. Eventuell Plasmarückruf resp. Look back einleiten.
<b>Influenza</b>	Gehe zu	Grippe

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Inguinalhernie, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Inokulationsverletzung</b>	Gehe zu	Kontakt mit Fremdblut
<b>Intimpartner</b>	Gehe zu	Sexuelle Kontakte, Intimpartner
<b>Kala-Azar</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Karpaltunnel-Syndrom</b>	Gehe zu	Handwurzelkanal, Operation
<b>Katarakt (Grauer Star)</b>	Definition	Linsentrübung
	Vorgehen	gehe zu Katarakt, Operation
<b>Katarakt Operation</b>	Definition	Entfernung der Augenlinse
	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Eingriff.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein Operation, Augen
<b>Kehlkopfentzündung</b>	Gehe zu	Tonsillitis
<b>Keratitis (Hornhautentzündung)</b>	Definition	Entzündung der Hornhaut, häufig infektiös.
	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach vollständiger Genesung und Abschluss der Therapie.
<b>Keuchhusten</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Klinische Versuchsstudien</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung von Spendern, die an klinischen Versuchen teilnehmen, bei welchen sie entweder noch nicht registrierte Medikamente einnehmen müssen oder sich mit Nadeln o.Ä. durch die Haut einspritzen lassen.</p> <p>Im Zweifelsfall Verweis auf Arzt des RBSD.</p>
<b>Knochenbruch</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.</p> <p>Rückweisung für 1 Monat nach Absetzen der Antikoagulation (präventiv) und/oder Gipsentfernung.</p>
	Siehe auch	Implantate
<b>Knochenbruch, Osteosynthese</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 1 Monat nach Entfernung des Materials für Osteosynthese.</p> <p>Rückweisung für 3 Monate nach Osteosynthese.</p>
	Siehe auch	<p>Bluttransfusion</p> <p>Implantate</p> <p>Operation / Eingriff allgemein</p>
<b>Knorpeloperation</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Wiederherstellung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Konjunktivitis (Bindehautentzündung)</b>	Definition	Entzündung der Bindehaut, häufig allergisch (Heuschnupfen) oder infektiös.
	Vorgehen	<p>gehe zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konjunktivitis infektiös</li> <li>• Konjunktivitis allergisch</li> </ul>
<b>Konjunktivitis allergisch</b>	Definition	Entzündung der Bindehaut i.R. von «Heuschnupfen».
	Vorgehen	Akzeptieren (wenn nicht schwer gerötete Augen)
<b>Konjunktivitis infektiös</b>	Definition	Entzündung der Bindehaut i.R. eines Infektes.
	Vorgehen	<p>Rückweisung für 2 Wochen</p> <p>nach vollständiger Genesung und Abschluss der Therapie.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Kontakt mit Fremdblut</b>	Definition	und/oder Nadelstichverletzung, Blutkontakt mit Schleimhaut oder verletzter Haut.
	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.
	Siehe auch	Spitalpersonal Verletzung
<b>Kopfschmerzen</b>	Vorgehen	Akzeptieren, falls nur gelegentliche Kopfschmerzen, wenn der Spender sich sonst gesund fühlt.
<b>Kopfverletzung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach Abschluss der Rehabilitation und bei Beschwerdefreiheit.
	Siehe auch	Epilepsie
<b>Koronarthrombose</b>	Gehe zu	Erkrankung, Kardio-vaskuläre
<b>Krampfaderentfernung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Eingriff.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein

Krebs	Vorgehen	Rückweisung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zur vollständigen Genesung (Wundheilung abgeschlossen, Wundverschlussmaterial entfernt) im Anschluss an Exzision eines Basalioms wenn keine Chemo- oder Radiotherapie erfolgt. Rückweisung für 2 Jahre nach Abschluss der Behandlung mit Vismodegib (Erivedge®).</li> <li>• 1 Monat nach erfolgreicher Operation eines Zervixkarzinoms in situ wenn keine Chemo- oder Radiotherapie erfolgt.</li> <li>• 5 Jahre nach Zervixkarzinom mit Operation, welche umfangreicher war als eine Konisation und Cervixkarzinom mit Operation und/oder Chemo- oder Radiotherapie vorausgesetzt, dass der Spender als geheilt gilt und dass eine vollständige Remission besteht.</li> <li>• 5 Jahre nach letzter Therapeutischer Handlung (Operation, Bestrahlung, Medikamentöse Behandlung des Malignoms, z.B. Chemotherapie, Immun-Therapie, VEGF-Inhibitoren, etc.) bei allen anderen Malignomen, vorausgesetzt, dass der Spender als geheilt gilt und dass eine vollständige Remission besteht.</li> </ul> <p>Ausschluss falls,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hämatologische Malignome</li> <li>• Malignom assoziiert mit Virämie (z.B. HIV, HTLV etc.)</li> </ul> <p>Jeder Entscheid über die erste Spende nach Malignom muss vom Arzt des RBSD getroffen und dokumentiert werden.</p>
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Kropf</b>	Gehe zu	Hyperthyreose
<b>Kugelzellenanämie</b>	Gehe zu	Sphärozytose hereditäre

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Kürettage</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Eingriff, falls keine maligne Erkrankung.
	Siehe auch	Abort Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Lambliasis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis mindestens 24 Stunden nach vollständiger Genesung und Absetzen aller rezeptfreien Arzneimittel.  Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
	Vorgehen	Rückweisung für mindestens 6 Monate.
<b>Laminektomie</b>	Vorgehen	Rückweisung für mindestens 6 Monate.
	Siehe auch	Diskushernie, Operation Operation / Eingriff allgemein
<b>Laryngitis</b>	Gehe zu	Tonsillitis
<b>Laserbehandlungen: Lasern bei Netzhaut- ablösung, Lasern der Hornhaut</b>	Gehe zu	Operation, Augen
<b>Lateralsklerose, amy- otrophische</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Leberentzündung, in- fektios</b>	Gehe zu	Hepatitis, unklare Anamnese
<b>Leberzirrhose</b>	Gehe zu	Zirrhose
<b>Legionärskrankheit</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.
<b>Leishmaniose</b>	Gehe zu	Kala-Azar

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Leptospirose</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.
<b>Lichen simplex</b>	Gehe zu	Ekzem
<b>Lidoperationen</b>	Gehe zu	Operation, Augen
<b>Lidrandentzündung</b>	Gehe zu	Blepharitis (Lidrandentzündung)
<b>Lungenembolie</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren nach vollständiger Erholung, falls FetteMBOLIE nach Unfall.</p> <p>Rückweisung für 12 Monate nach Absetzen der Antikoagulationsbehandlung, falls:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Embolie klar durch eine mechanisch oder durch Immobilisierung bedingte Thrombose verursacht worden ist,</li> <li>2. oder es sich um eine einzelne Thromboseepisode ohne Rezidive handelt.</li> </ol> <p>Ausschluss in allen anderen Fällen.</p>
	Siehe auch	Thrombose, Venen tief
<b>Lyme-Krankheit</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, wenn positiver Antikörper-Nachweis ohne Symptome</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach erfolgreicher Behandlung und vollständiger Genesung.</p> <p>Ausschluss, falls chronische Infektion.</p>
<b>Lymphangitis</b>	Vorgehen	Ausschluss, falls bösartige Krankheit.
	Siehe auch	Erysipel
<b>Lymphogranuloma venereum</b>	Vorgehen	Temporäre Rückweisung bis zum ärztlich dokumentierten Behandlungserfolg.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Maculadegeneration (AMD)</b>	Definition	Veränderung der Sehnervenzelle in der Makula.
	Zu beachten	Dies sind Patienten die eine «Spritze ins Auge erhalten»
	Vorgehen	Ausschluss
<b>Magenband</b>	Gehe zu	Operation, viszerale
<b>Magendarmentzündung</b>	Gehe zu	Gastritis
<b>Magengeschwür</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung.
	Siehe auch	Endoskopie Gastrektomie
<b>Malaria / Malariaregionen</b>	Zu beachten	<p>Folgende Spender dürfen erst wieder zugelassen werden, falls ein Labortest für Malaria (IF oder ELISA), der mindestens 4 Monate nach der Rückkehr durchgeführt wird, negativ ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei unerklärbarem Fieber oder anderen Krankheitszeichen während oder nach dem Aufenthalt;</li> <li>• Bei positiver Malariaanamnese;</li> <li>• Bei Aufenthalt in einem Malaria-Endemiegebiet &gt; 6 Monate.</li> </ul>
	Vorgehen	<p>Rückweisung für 4 Monate nach Rückkehr aus einem Endemiegebiet, falls ein Labortest für Malaria (IF oder ELISA) ein negatives Resultat ergibt.</p> <p>Rückweisung für mindestens 6 Monate nach Rückkehr aus einem Endemiegebiet, bei fehlender Malaria Testung.</p> <p>Ist das Resultat positiv gilt eine Rückweisung für 3 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist kann erneut ein Test durchgeführt werden. Ausschluss, im Falle dass der Test wiederum positiv ist. Ausschluss, falls kein Labortest durchgeführt wird.</p> <p>Siehe Kap.17E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Malaria Prophylaxe</b>	Vorgehen	Akzeptieren vor der Reise.
<b>Mantoux-Probe</b>	Vorgehen	Rückweisung bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, jedoch mindestens 1 Woche nach Injektion des Tuberkulins.
	Siehe auch	Tuberkulose
<b>Marfan-Syndrom</b>	Vorgehen	Ausschluss
<b>Masern</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Genesung.
<b>Mastoiditis</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
<b>Mastoidoperation</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Medikamente</b>	Gehe zu	Arzneimittelbehandlung
<b>Meniere-Krankheit</b>	Gehe zu	Schwindel
<b>Meningitis</b>	Zu beachten	Überprüfen, ob keine Anfälle in der Vorgeschichte.
	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach Abklingen der Symptome und vollständiger Genesung.
<b>Meningoenzephalitis</b>	Gehe zu	Zeckenenzephalitis (FSME)
<b>Meniskus, Operation</b>	Gehe zu	Operation, Knochen, Gelenke

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Menstruation</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren auch während der Periode, falls der Hb-Wert normal ist.</p> <p>Rückweisung, falls die Periode ausgeblieben ist und damit eine Schwangerschaft möglich wäre.</p>
<b>Meulengracht -Syndrom</b>	Gehe zu	Gilbert-Meulengracht Syndrom
<b>Microblading</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate
<b>Migräne</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls zum Zeitpunkt der Spende keine Kopfschmerzen.</p> <p>Rückweisung für 1 Monat nach der Einnahme von Dihydroergotamin (Dihydrogot®, und Cefergot®; in der Schweiz nicht mehr zugelassen).</p>
<b>Mononucleosis infectiosa</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung.
<b>Morbus Boeck</b>	Gehe zu	Sarkoidose
<b>Morbus-Crohn</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Multiple Sklerose</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Mumps</b>	Gehe zu	Masern
<b>Muskeldystrophie</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Mykose</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls topisch.</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der systemischen Behandlung und nach vollständiger Genesung.</p> <p>Ausschluss bei Organmykose.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Myoma uteri Entfernung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung.
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Myomenukleation</b>	Gehe zu	Myoma uteri Entfernung
<b>Myxödem</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn trotz Behandlung instabil ist.
	Siehe auch	Hypothyreose
<b>Nadelstichverletzung</b>	Siehe auch	Kontakt mit Fremdblut
		Piercing
		Spitalpersonal
		Tätowierung
<b>Nahrungsmittelallergie</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn schwerwiegend.
<b>Nahrungsmittelvergiftung</b>	Gehe zu	Durchfallerkrankung
<b>Narkose</b>	Zu beachten	Die Anästhesie ist nicht massgebend für eine eventuelle Rückweisung.
	Vorgehen	Rückweisung je nach Operation und Heilungszustand des Spenders. Im Zweifelsfall Verweis auf Arzt des RBSD.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Nasenbluten</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls schweres und regelmässig auftretendes Problem mit Anämie.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Naturheilmedizin</b>	Zu beachten	Behandlung mit Naturheilmitteln ist kein alleiniger Rückweisungsgrund. Es ist dabei stets auf die Art der Medikamentenverabreichung (i.v., s.c., extrakorporale Blutbehandlung), auf die Herkunft der Medikamente (Mensch/Tier) und auf die zugrunde liegende Erkrankung zu achten.
	Vorgehen	Akzeptieren, falls Homöopathiebehandlung.
	Siehe auch	Akupunktur
<b>Nebenniereninsuffizienz</b>	Vorgehen	Ausschluss, auch falls substituiert.
<b>Nematoden</b>	Gehe zu	Wurmkrankheiten
<b>Nephrektomie</b>	Gehe zu	Operation / Eingriff allgemein
<b>Nephritis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis 5 Jahre nach vollständiger Erholung der Nierenfunktion, falls akute Nephritis.  Ausschluss, falls chronische Nephritis.
<b>Netzhautablösung (ablatio retinae)</b>	Definition	Netzhautablösung aufgrund verschiedener Ursachen: häufige Ursachen sind Diabetes, Hypertonie, Myopie und Trauma.
	Zu beachten	Nach der Grunderkrankung fragen.
	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Abschluss von Therapie inkl. Laserbehandlung.
<b>Neurofibromatose</b>	Vorgehen	Ausschluss, falls eine Therapie gegen maligne Entartung durchgeführt wird.
	Siehe auch	Krebs
<b>Neuroleptika</b>	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD
<b>Nierenentfernung</b>	Gehe zu	Operation / Eingriff allgemein

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Niereninsuffizienz, chronische</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Nierenkolik</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls Symptome.
	Siehe auch	Nierensteine
<b>Nierensteine</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls Symptome und/oder Infektion (Schmerz, Fieber).
<b>Nierensteine, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Urolitholyse/Urolithotrypsie. Rückweisung für 6 Monate nach der Operation.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Nikotinentwöhnung</b>	Vorgehen	Akzeptieren
<b>Oesophagitis</b>	Gehe zu	Gastritis
<b>Ohnmacht</b>	Gehe zu	Bewusstlosigkeit
<b>Ohrenschmerzen / Ohreninfektion</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Abschluss der Antibiotikabehandlung.

Operation / Eingriff allgemein	Vorgehen	Rückweisung :
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis zur vollständigen Genesung und bis nach Abschluss der postoperativen Behandlung;</li> <li>• zusätzlich 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung;</li> <li>• zusätzlich 1 Monat nach Abschluss der präventiven Behandlung mit Antikoagulanzen;</li> <li>• für 1 Monat bei kleinen Eingriffen ohne Komplikationen;</li> <li>• für 4 Monate nach Eingriff in Ländern mit erhöhter HIV, HBV, HCV-Rate;</li> <li>• für 6 bis 12 Monate bei grossen Operationen, nach Ermessen des Arztes des RBSD.</li> </ul> <p>Rückweisung für 2 Monate vor einer geplanten Operation mit Ausnahme kleiner Eingriffen (z. B. Sterilisation, Warzen, etc.).</p> <p>Ausschluss, falls:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übertragungsrisiko von Prionen (z. B. Transfusion nach 1980, Hirnhaut- resp. Hornhauttransplantation);</li> <li>• Transplantation, ausser bei autologer.</li> </ul> <p>Bei maligner Erkrankung ist das gleiche Vorgehen anzuwenden, wie beim Kriterium "Krebs".</p>
	Siehe auch	Bluttransfusion Creutzfeldt-Jakob-Krankheit Endoskopie Implantate Krebs Narkose Stoma Transplantation

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Operation, Augen</b>	Zu beachten	Es muss immer der Grund der Operation erfragt werden.
	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat
	Siehe auch	Glaukom Operation Katarakt Operation Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Operation, Brustkorb</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach der Operation.
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Operation, Gynäkologische</b>	Zu beachten	Untersuchung von Blutgruppenalloantikörpern, falls Schwangerschaft.
	Siehe auch	Abort Brust, Knoten, Biopsie Fibroadenom der Brust, Entfernung Gebärmuttersenkung, Operation Hysterektomie Krebs Kürettage Myoma uteri Entfernung Operation / Eingriff allgemein Sterilisation Tumorektomie, Brust Zervixkonisation
<b>Operation, Hals- Nasen- Ohren</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach kleinem Eingriff (Mandeln, Nebenhöhle, etc.). Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls grosser Eingriff.
	Siehe auch	Krebs Mastoidoperation Operation / Eingriff allgemein Tonsillektomie

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

---

**Operation, Haut**

Siehe auch

 Krebs  
 Operation / Eingriff allgemein

---

**Operation, Herz- bzw. Gefässe**

Gehe zu

Erkrankung, Kardio-vaskuläre

---

**Operation, Knochen, Gelenke**

Vorgehen

 Rückweisung für 1 Monat  
 Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls grosser Eingriff.

Siehe auch

 Hüft- Knie Prothese  
 Implantate  
 Knochenbruch, Osteosynthese  
 Knorpeloperation  
 Krebs  
 Operation / Eingriff allgemein

---

**Operation, urologische**

Siehe auch

 Krebs  
 Nierensteine, Operation  
 Operation / Eingriff allgemein  
 Prostatektomie  
 Unterbindung (Männer)  
 Varikozele, Operation

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Operation, viszerale</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 1 Monat bei kleinen Eingriffen ohne Komplikationen, von 6 Monate nach grossen Operationen und bis zur vollständigen Genesung.</p> <p>Rückweisung für 3 Jahre , falls Adipositaschirurgie (z.B. Magenband, Gastroplastiken, Restriktiv-malabsorptive Verfahren, Malabsorptive Verfahren).</p>
	Siehe auch	<p>Blinddarmoperation</p> <p>Cholezystektomie</p> <p>Gastrektomie</p> <p>Hämorrhoiden, Behandlung</p> <p>Hiatushernie, Operation</p> <p>Ileostoma</p> <p>Inguinalhernie, Operation</p> <p>Krebs</p> <p>Operation / Eingriff allgemein</p> <p>Polypektomie, Dickdarm</p> <p>Splenektomie</p> <p>Stoma</p>
<b>Operation, ZNS</b>	Vorgehen	Ausschluss. Ausnahme: Eingriffe ohne Eröffnung der der Dura-Mater.
	Siehe auch	<p>Diskushernie, Operation</p> <p>Krebs</p> <p>Laminektomie</p> <p>Operation / Eingriff allgemein</p> <p>Spondylodese, Operation</p>
<b>Osteomyelitis</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre nach Ausheilung und nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
<b>Ovarialzyste</b>	Zu beachten	Assoziierte Krankheiten (polyzystische Nieren oder andere Krankheiten).
	Vorgehen	<p>Akzeptieren bei normaler Nierenfunktion.</p> <p>Falls maligne Erkrankung ist das gleiche Vorgehen anzuwenden, wie beim Kriterium "Krebs".</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Panikstörung</b>	Definition	Eine Angststörung, gekennzeichnet durch mehrere Panikattacken pro Monat und damit verbundenen Erwartungsangst oder Vermeidungsverhalten mit Einschränkungen im Alltag.
	Vorgehen	Akzeptieren, wenn am Tag der Spende stabil. Kann der stabile Status nicht bestimmt werden, ist die Spendetauglichkeit durch den Arzt des RBSD zu beurteilen.
<b>Pankreatitis</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Monate nach einem Anfall, falls symptomfrei.
<b>Paratyphus</b>	Gehe zu	Typhus
<b>Parkinson-Syndrom</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Pemphigus</b>	Vorgehen	Rückweisung bis die Symptome verschwunden sind. Ausschluss, falls Autoimmunkrankheit.
<b>Perikarditis, virale</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.
<b>Peritonitis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung. Falls maligner Prozess ist das gleiche Vorgehen anzuwenden, wie beim Kriterium "Krebs".
	Siehe auch	Krebs
<b>Peritonsillitis</b>	Gehe zu	Tonsillitis
<b>Petit Mal</b>	Gehe zu	Epilepsie
<b>Pfeiffer-Drüsenfieber</b>	Gehe zu	Mononucleosis infectiosa
<b>Pharyngitis</b>	Gehe zu	Tonsillitis

<b>Phlebitis</b>	Gehe zu	Thrombose, Venen oberflächlich
<b>Piercing</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate.
<b>Pilzinfektion</b>	Gehe zu	Mykose
<b>Pleuritis</b>	Gehe zu	Brustfellentzündung
<b>Pneumonie</b>	Vorgehen	Rückweisung während mindestens 6 Wochen nach Abklingen der Symptome und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung. Ausschluss bei malignem Prozess.
<b>Pneumothorax</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur Genesung der Verletzung, falls traumatisch oder spontan. Ausschluss, wenn durch Emphysem bedingt.
<b>Poliomyelitis</b>	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD
<b>Polyarthrit</b>	Gehe zu	Arthritis
<b>Polypektomie, Dickdarm</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate nach der Operation, gemäss Schweregrad des Eingriffes und möglicher Komplikationen. Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD anhand des histologischen Befunds.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Polyposis intestinalis</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls Symptome. Ausschluss, falls Polyposis familiaris.
<b>Polytrauma</b>	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD.
	Siehe auch	Bluttransfusion Operation / Eingriff allgemein

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Polyzythämia vera</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Postexpositionsprophylaxe PEP und Präexpositionsprophylaxe PrEP</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate nach Ende der PEP / PrEP-Behandlung.
<b>Proktitis</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls Behandlung.
	Siehe auch	Colitis ulcerosa Morbus-Crohn
<b>Prostatavergrößerung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Wochen nach Absetzen der Behandlung mit Finasteride oder Proscar®.  Rückweisung für 6 Monate nach Absetzen der Behandlung mit Dutasterid (Avodart®) oder Dutasterid/Tamsulosin (Duodart®). Die Einnahme von Tamsulosin alleine ist zugelassen (z.B. Pradif®, Tamsulosin T-Mepha® retard).
<b>Prostatektomie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung, falls gutartig.  Falls maligne Erkrankung ist das gleiche Vorgehen anzuwenden, wie beim Kriterium "Krebs".
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein
<b>Prostitution, Sexworker</b>	Definition	Sexworker sind Personen die sexuelle Kontakte unter Annahme von Geld, Drogen oder Medikamenten haben.
	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate für Sexworker.  Rückweisung für 12 Monate nach Sexualkontakt mit Sexworkern. Diese Frist kann auch auf 4 Monate reduziert werden, unter der Bedingung, dass der/die Sexworker ihre Aktivität vollständig seit mindestens 12 Monaten aufgehört hat.  Ausschluss für Sexworker, die Kontakte unter Annahme von Drogen zur Injektion hatten.  Siehe "Informationsblatt für BlutspenderInnen".

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Psoriasis</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls leichte Form, nicht im Bereich der Einstichstelle und keine systemische Behandlung.</p> <p>Rückweisung für 12 Monate nach Absetzen einer Behandlung mit Methotrexat.</p> <p>Rückweisung für 3 Jahre nach Absetzen der Behandlung mit Acitretin (Neotigason®).</p> <p>Ausschluss, falls generalisiert und schwerwiegend.</p>
	<b>Psychose, akut</b>	<p><b>Definition</b></p> <p>Psychose bezeichnet eine Gruppe schwerer psychischer Störungen, die mit einem weitgehenden zeitweiligen Verlust des Realitätsbezugs einhergehen.</p> <p><b>Zu beachten</b></p> <p>Mindestens einmalige Beurteilung der Grunderkrankung durch den Arzt des RBSD.</p> <p>Polymedikation und Spitalaufenthalte sind zu berücksichtigen.</p> <p><b>Vorgehen</b></p> <p>Rückweisung , bis die Symptome verschwunden sind.</p> <p>Bei Unklarheit ob akut oder nicht, ist die Spendetauglichkeit durch den Arzt des RBSD zu beurteilen.</p>
	<b>Psychose, nicht akut</b>	<p><b>Definition</b></p> <p>Psychose bezeichnet eine Gruppe schwerer psychischer Störungen, die mit einem weitgehenden zeitweiligen Verlust des Realitätsbezugs einhergehen.</p> <p><b>Zu beachten</b></p> <p>Mindestens einmalige Beurteilung der Grunderkrankung durch den Arzt des RBSD.</p> <p>Polymedikation und Spitalaufenthalte sind zu berücksichtigen.</p> <p><b>Vorgehen</b></p> <p>Akzeptieren , wenn am Tag der Spende stabil.</p> <p>Bei Unklarheit ob akut oder nicht, ist die Spendetauglichkeit durch den Arzt des RBSD zu beurteilen.</p>
<b>Pyelonephritis</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und mindestens 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung, falls akut.</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls rezidivierend.</p>
<b>Q-Fieber</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre, nach Genesung.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Raynaud-Krankheit</b>	Vorgehen	Rückweisung, solange Symptome vorhanden sind. Ausschluss, falls Begleitsymptom einer anderen Erkrankung.
<b>Recklinghausen-Krankheit</b>	Gehe zu	Neurofibromatose
<b>Reizdarm</b>	Vorgehen	Rückweisung nur, wenn Spender am Tag der Blutspende symptomatisch ist.
<b>Retinopathia Pigmentosa</b>	Definition	Absterben der Netzhautzellen, meist genetisch bedingt.
	Vorgehen	Ausschluss nach Bestätigung der Diagnose durch behandelnden Arzt oder Augenarzt, falls sie im Zusammenhang mit einer Refsumerkkrankung steht.
<b>Rheumatisches Fieber</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre nach einem isolierten Anfall. Ausschluss, falls wiederholte Attacken bzw. permanente Antibiotikaphylaxe nötig.
<b>Rhinitis</b>	Vorgehen	Rückweisung während der Behandlung, falls chronisch. Rückweisung bis zum Abklingen der Symptome, falls akut.
	Siehe auch	Erkältung
<b>Rickettsiose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Wochen Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
<b>Rippenfellentzündung</b>	Gehe zu	Brustfellentzündung
<b>Risikosituationen</b>	Definition	Situation, welche die Gesundheit des Spenders und/oder des Empfängers gefährden kann.
	Zu beachten	Siehe auch "Informationsblatt für BlutspenderInnen" (von 1 bis 12).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Rotavirus/Enterovirus</b>	Gehe zu	Durchfallerkrankung
<b>Röteln</b>	Gehe zu	Masern
<b>Rückfallfieber</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre nach vollständiger Genesung.
<b>Salmonella Typhi und Paratyphi</b>	Gehe zu	Typhus
<b>Salmonellose, Kontakt</b>	Gehe zu	Gastroenteritis, Kontakt
<b>Salpingitis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.
<b>Sarkoidose</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn akut und nur wenn der Schub kurz und leicht war und keine Behandlung erforderte. Ausschluss, wenn chronisch.
<b>Scharlach</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und/oder 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
<b>Scharlach, Kontakt</b>	Vorgehen	Rückweisung für 3 Tage nach dem Kontakt.
<b>Schaufensterkrankheit</b>	Gehe zu	Claudicatio intermittens
<b>Schielen</b>	Gehe zu	Operation, Augen
<b>Schilddrüsenentzündung</b>	Gehe zu	Autoimmunthyreoiditis
<b>Schilddrüsenüberfunktion</b>	Gehe zu	Hyperthyreose

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Schilddrüsenunterfunktion</b>	Gehe zu	Hypothyreose
<b>Schistosomiasis</b>	Gehe zu	Bilharziose
<b>Schizophrenie</b>	Definition	Eine Gruppe schwerer psychischer Krankheitsbilder, die mit Realitätsverlust einhergehen. Dazu gehören schizoaffektive Störung, schizoforme Störung.
	Zu beachten	Mindestens einmalige Beurteilung der Grunderkrankung durch den Arzt des RBSD.  Polymedikation und Spitalaufenthalte sind zu berücksichtigen.
	Vorgehen	Akzeptieren, wenn am Tag der Spende stabil.  Kann der Realitätsverlust der Schizophrenie nicht beurteilt werden, ist die Spendetauglichkeit durch den Arzt des RBSD zu beurteilen.
<b>Schlafkrankheit</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Schlaganfall</b>	Gehe zu	Erkrankung, Zerebro-vaskuläre
<b>Schuppenflechte</b>	Gehe zu	Psoriasis
<b>Schwangerschaft</b>	Vorgehen	Rückweisung während der Schwangerschaft und bis 12 Monate nach der Entbindung.
	Siehe auch	Abort
<b>Schwangerschaftsabbruch</b>	Gehe zu	Abort
<b>Schwangerschaftswunsch</b>	Vorgehen	Akzeptieren  Rückweisung für 6 Monate nach der letzten Einnahme von Clomid/ Clomifen® (teratogen).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Schwindel</b>	Vorgehen	Rückweisung, wenn Symptome und unter Therapie. Abklärung, falls unbekannte Ursache.
<b>Sehbehinderung</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn der Spender den Vorgang der Blutspende/die Blutuntersuchungen auf übertragbare Krankheiten voll verstanden hat, sein Einverständnis gegeben hat und bei der Blutspende Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden können. Der Fragebogen muss mit Hilfe des Spendepersonals ausgefüllt werden.
<b>Semi-permanentes Make-up</b>	Gehe zu	Tätowierung
<b>Sexualverkehr unter dem Einfluss von synthetischen Drogen; Chem-Sex</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate nach praktiziertem Chem-Sex.
	Siehe auch	Drogengebrauch Sexuelle Kontakte, Intimpartner



**Sexuelle Kontakte, In-  
timpartner**

Vorgehen

Rückweisung für 4 Monate nach:

- Sexuale Kontakt mit einer neuen Partnerin bzw. einem neuen Partner. Eine "neue Partnerin bzw. einen neuen Partner" bedeutet:
  - eine Person, mit der der Spender oder die Spenderin noch keinen Sexuale Kontakt hatte ODER
  - eine Person, mit der der Spender oder die Spenderin eine sexuelle Beziehung hatte, die beendet wurde, und mit der der Spender oder die Spenderin in den letzten 4 Monaten wieder Sexuale Kontakt aufnahm.
- Rückkehr des Sexualpartners/-in, die sich für 6 Monate oder länger in Ländern mit erhöhter HBV, HCV, HIV-Rate aufgehalten oder dort Bluttransfusionen erhalten haben;
- Letztem Sexuale Kontakt mit Partnern die sich Drogen injizieren (aktuell).

Rückweisung für 6 Monate nach letztem Sexuale Kontakt:

- Mit Partnern mit Hepatitis B oder C.

Rückweisung für 12 Monate nach letztem Sexuale Kontakt:

- Mit wechselnden Partnern in den letzten 4 Monaten (mehr als 2 Personen);
- Mit Partnern mit positivem Test für HIV, Syphilis;
- Mit Partnern die in den letzten 4 Monaten Sexuale Kontakt mit mehr als 2 Personen hatten;
- Mit Sexworkern. Diese Frist kann auch auf 4 Monate reduziert werden, unter der Bedingung, dass der/die Sexworker ihre Aktivität vollständig seit mindestens 12 Monaten aufgehört hat;

Siehe Kapitel 17 E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.

Siehe "Informationsblatt für Blutspenderinnen und Blutspender".



	Siehe auch	Chlamydia Gonorrhö Hepatitis B Hepatitis B, Sexualpartner Hepatitis C Hepatitis C, Sexualpartner HIV Lymphogranuloma venereum Prostitution, Sexworker Sexualverkehr unter dem Einfluss von synthetischen Drogen; Chem-Sex Syphilis Syphilis, Sexualpartner
<b>Shigellose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung.
	Siehe auch	Gastroenteritis, Kontakt
<b>Shigellose, Kontakt</b>	Gehe zu	Gastroenteritis, Kontakt
<b>Sicca-Syndrom</b>	Gehe zu	Trockenes Auge (Sicca-Syndrom)
<b>Sinusitis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung, falls akut. Rückweisung, falls behandlungsbedürftig oder bei nicht ausschliesslicher Anwendung einer Medikation zum Abschwellen der Nasenschleimhaut für chronische Erkrankung.
<b>Sinusvenenthrombose</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Soor</b>	Vorgehen	Akzeptieren, falls lokale Behandlung, bei vulvovaginaler Soor/Balanitis mycotica, wenn keine Grundkrankheit besteht. Rückweisung bei Soor an anderen Stellen.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Sphärozytose hereditäre</b>	Vorgehen	Ausschluss
<b>Spiegelung</b>	Gehe zu	Endoskopie
<b>Spirale</b>	Vorgehen	Rückweisung für 72h nach Einsetzen.
<b>Spitalpersonal</b>	Vorgehen	Rückweisung, nur wenn Kontakt mit Fremdblut (Nadelstich, Skalpell, etc.) stattfand.
	Siehe auch	Kontakt mit Fremdblut
<b>Splenektomie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung, falls traumatisch.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Spondylitis ankylosans</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate nach Therapie mit monoklonalen Antikörpern.  Ausschluss nur, falls Hinweise für kardio-vaskuläre Beteiligung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Spondylodese, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 bis 12 Monate nach der Operation, falls komplikationsfrei.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Stammzellspende</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate
<b>Sterilisation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Sterilität</b>	Gehe zu	Schwangerschaftswunsch
<b>Stoma</b>	Vorgehen	Ausschluss.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Struma</b>	Gehe zu	Hyperthyreose
<b>Syphilis</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Syphilis, Sexualpartner</b>	Vorgehen	Rückweisung für 12 Monate, wenn alle Bluttests negativ sind.
<b>Systemischer Lupus Erythematodes (SLE)</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Tachykardie</b>	Vorgehen	Rückweisung nach wiederholter Messung mit Puls > 100/Min.
<b>Tätowierung</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Monate
<b>Temporalarteritis</b>	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD.
<b>Thalassaemie</b>	Zu beachten	Die klinische Manifestation und nicht die Genetik ist bestimmend.
	Vorgehen	Akzeptieren, wenn der Spender Träger einer Alpha- oder Beta-Thalassaemie minor ist, bei guter Gesundheit ist und der Hämoglobinwert im erlaubten Bereich liegt.
<b>Thrombophilie</b>	Siehe auch	Gerinnungsstörung Thrombose, Arterien Thrombose, Venen oberflächlich Thrombose, Venen tief
<b>Thrombose, Arterien</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Thrombose, Venen oberflächlich</b>	Zu beachten	Antikoagulation
	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung. Ausschluss, falls wiederholte Thrombose.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Thrombose, Venen tief</b>	Zu beachten	Die Inzidenz für wiederholte venöse Thromboembolien nach einer venösen Thromboembolie ist unabhängig von der Dauer der Antikoagulation (catch-up Phänomen) und beträgt ca. 5-10%.
	Vorgehen	Rückweisung für 1 Jahr nach abgesetzter Antikoagulation. Ausschluss, falls wiederholte Thrombose.
	Siehe auch	Augenvenenthrombose Sinusvenenthrombose
<b>Thrombozythämie primäre</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Thrombozytopathien</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Tonsillektomie</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung und bis 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Tonsillitis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und bis mindestens 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
<b>Toxoplasmose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 6 Monate nach Genesung.
<b>Tracheitis</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung.
<b>Transitorisch ischämische Attacken (TIA)</b>	Gehe zu	Erkrankung, Zerebro-vaskuläre

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Transmenschen / Transgender</b>	Zu beachten	Transgender Personen, insbesondere Männer die zu Frauen wurden, haben gemäss internationalen Studien oftmals ein erhöhtes HIV-Risiko. Für die Schweiz gibt es keine Studien zur HIV Prävalenz bei Transgender Personen. Sexuelles oder anderes Risikoverhalten sollte daher bei Transgender Personen besonders berücksichtigt werden.
	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD
<b>Transplantation</b>	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls autologes Gewebe, Organ oder Zellen oder daraus hergestellte Transplantatprodukte (abhängig von der Grunderkrankung).</p> <p>Ausschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• falls allogenes Gewebe, Organ, Zellen (inklusive embryonale oder fötale Gewebe oder Zellen), oder daraus hergestellte Transplantatprodukte</li> <li>• falls Xenotransplantation</li> <li>• falls Stammzelltransplantation (autolog und allogene)</li> </ul>
	Siehe auch	<p>Bänderriss</p> <p>Knochenbruch</p> <p>Knorpeloperation</p> <p>Operation / Eingriff allgemein</p> <p>Operation, Knochen, Gelenke</p> <p>Polytrauma</p> <p>Splenektomie</p>
<b>Trippler</b>	Gehe zu	Gonorrhö
<b>Trockenes Auge (Sicca-Syndrom)</b>	Definition	Trockenheit des Auges aufgrund verschiedener Ursachen.
	Vorgehen	<p>Akzeptieren</p> <p>auch bei Therapie mit autologen Serumaugentropfen.</p> <p>Ausschluss, wenn eine systemischen Autoimmunerkrankung vorliegt.</p>

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Trypanosoma Cruzi</b>	Gehe zu	Chagas-Krankheit
<b>Trypanosomiasis, afrikanische</b>	Gehe zu	Schlafkrankheit
<b>Tubensterilisation</b>	Gehe zu	Sterilisation
<b>Tuberkulose</b>	Vorgehen	Rückweisung für 2 Jahre nach Beendigung jeglicher Nachsorge und Absetzen aller Medikamente. Ausschluss, falls Rückfall unter Behandlung.
	Siehe auch	Mantoux-Probe
<b>Tuberkulose, Kontakt</b>	Gehe zu	Mantoux-Probe
<b>Turner-Syndrom</b>	Vorgehen	Ausschluss, wenn der Spender untergewichtig ist und/oder angeborene Herzkrankheit aufweist.
<b>Typhus</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und bis mindestens 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung.
<b>Ulcus molle</b>	Gehe zu	Gonorrhö
<b>Ulcus peptisches</b>	Gehe zu	Magengeschwür
<b>Unterbindung (Männer)</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Urethritis unspezifische</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und bis 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung, falls akut. Ausschluss, falls chronisch.

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Urtikaria</b>	Vorgehen	Rückweisung, falls generalisiert. Die Dauer ist durch den Arzt des RBSD zu bestimmen.
	Siehe auch	Allergie
<b>Uveitis</b>	Definition	Eine Uveitis ist eine Augenentzündung, bei der die Gefäßhaut (Uvea) im Auge beteiligt ist.
	Zu beachten	Nach Grunderkrankung fragen.
	Vorgehen	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD
<b>Vaquez-Krankheit</b>	Gehe zu	Polyzythämia vera
<b>Varikozele, Operation</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Eingriff.
	Siehe auch	Operation / Eingriff allgemein
<b>Varizellen</b>	Gehe zu	Masern
<b>Vasektomie</b>	Gehe zu	Unterbindung (Männer)
<b>Verletzung</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Wiederherstellung (ohne Zeichen von Hautentzündung).
	Siehe auch	Spitalpersonal Traumatologie
<b>Vitiligo</b>	Vorgehen	Ausschluss, falls Teil einer Multisystemkrankheit.
<b>Vitrektomie</b>	Definition	Die Vitrektomie bezeichnet die chirurgische Entfernung von Teilen des Glaskörpers oder auch des gesamten Glaskörpers aus dem Auge.
	Vorgehen	Gehe zu Operation, Augen

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Von Willebrand-Syndrom</b>	Vorgehen	<p>Ausschluss, falls Symptome.</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt des RBSD, falls nur Positivbefund im Rahmen der Familienabklärung.</p>
<b>Wachstumsstörung</b>	Vorgehen	Ausschluss, bei Therapie mit Hormonen, die aus menschlichen Geweben hergestellt wurden.
<b>Warzen</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn Hautwarzen nur lokal behandelt werden und Haut intakt ist.
<b>West-Nile-Virus Erkrankung</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 1 Monat nach Aufenthalt in Risikogebiet.</p> <p>Rückweisung für 4 Monate nach vollständiger Genesung.</p> <p>Siehe Kap.17E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.</p>
<b>Wunde</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung, falls offene Wunde.</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach Entfernung des Materials bei Wundnaht bzw. -verschluss und ohne Anzeichen von Infektion.</p>
<b>Wurmkrankheiten</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zum erfolgreichen Abschluss der Therapie.
	Siehe auch	Bilharziose Echinokokkose Filariose
<b>Yersiniose</b>	Gehe zu	Shigellose
<b>Zahnabszess</b>	Gehe zu	Abszess

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Zahnbehandlung</b>	Zu beachten	<p>Bei anderen, nicht aufgelisteten Implantaten, für deren Herstellung Gewebe oder Zellen menschlichen oder tierischen Ursprungs oder ihre Derivate verwendet werden, ist die Spendetauglichkeit nur gegeben, wenn das EG-Zertifikat und die EG-Konformitätserklärung des Implantates nach der neuen Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) ausgestellt worden sind.</p> <p>Implantate mit EG-Zertifikaten nach der alten Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG (MDD) können im Ermessen des ärztlichen Dienstes zugelassen werden, wenn der Hersteller dem RBSD schriftlich bestätigt, dass aufgrund der Herkunft der Ausgangsmaterialien und der Herstellverfahren dieser Produkte die Abwesenheit von Erregern (inkl. Viren und Prionen) übertragbarer Krankheiten gewährleistet ist.</p> <p>Die EG-Zertifikate müssen minimal, bezüglich der Richtigkeit, auf folgenden Punkte überprüft werden: Richtlinie/Verordnung, Gültigkeitsdauer/Ablaufdatum des Zertifikates, Herstellername und Produktbezeichnung.</p>
	Vorgehen	<p>Akzeptieren, falls zahnchirurgische Implantate wie Cerabone®, Bio-Oss®, Bio-Oss Collagen® und Bio-Gide® verwendet werden.</p> <p>Rückweisung für 24 Stunden, falls Zahnsteinentfernung.</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach Behandlungsabschluss, falls komplizierter chirurgischer Eingriff.</p>
	Siehe auch	Abszess
<b>Zahnextraktion</b>	Vorgehen	<p>Rückweisung für 1 Woche nach Zahnextraktion.</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der antibiotischen Behandlung und Verschwinden der Symptome nach komplizierter Extraktion.</p>
<b>Zahnoperation</b>	Vorgehen	<p>Gehe zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnbehandlung</li> <li>• Zahnextraktion</li> </ul>
<b>Zeckenenzephalitis (FSME)</b>	Vorgehen	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung (6 Monate nach Behandlungsabschluss ohne Symptome).

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

<b>Zeckenstich</b>	Vorgehen	Rückweisung für 4 Wochen nach Zeckenstich, falls ohne Symptome.
	Siehe auch	Lyme-Krankheit Rickettsiose
<b>Zervixdysplasie</b>	Gehe zu	Krebs
<b>Zervixkarzinom in situ</b>	Gehe zu	Krebs
<b>Zervixkonisation</b>	Vorgehen	Akzeptieren, wenn keine weitere Behandlung geplant ist. Bei maligner Erkrankung ist das gleiche Vorgehen anzuwenden, wie beim Kriterium "Krebs".
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff allgemein Zervixkarzinom in situ
<b>Zika-Virus</b>	Vorgehen	Rückweisung für 1 Monat nach Aufenthalt in einem Risikogebiet.
		Rückweisung für 3 Monate nach sexuellem Kontakt mit einem Partner mit einer bestätigten ZIKV Infektion
		Rückweisung für 4 Monate nach vollständiger Genesung.
		Siehe Kapitel 17 E: Travelcheck-Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken.
<b>Zirrhose</b>	Vorgehen	Ausschluss.
<b>Zöliakie</b>	Vorgehen	Akzeptieren, falls Blutbild in Ordnung und bei ausschliesslich diätetischer Behandlung.
<b>Zuckerkrankheit</b>	Gehe zu	Diabetes mellitus
<b>Zwölffingerdarmgeschwür</b>	Gehe zu	Duodenalulkus

 BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ TRANSFUSION CRS SUISSE TRASFUSIONE CRS SVIZZERA	Anhang 7.5 Spendetauglichkeitskriterien	
	Dokumentart: ANH	
	Gültig ab: 01.07.2024	Version: 1

**Zystitis**

Gehe zu

Blasenentzündung