



Infection	Tableau infectieux chez un donneur	Tableau infectieux chez un receveur
VIH	Signes cliniques lors du don et/ou séroconversion et/ou NAT VIH positif dans les 6 mois suivant le don.	Signes cliniques d'une infection récente, dans les 6 mois après administration de produits sanguins et/ou ;
		Séroconversion anti-VIH et/ou dépistage de l'ARN du VIH dans les 6 mois après administration de produits sanguins.
VHB	Signes cliniques d'une infection récente lors du don et/ou dépistage du génome du VHB et/ou dépistage d'IgM anti-HBc et/ou séroconversion anti-HBs, en l'absence de vaccination et/ou anti-HBc confirmé sans anti-HBs et/ou Ag HBs positif lors d'un examen ultérieur.	Signes cliniques d'une infection récente par le VHB dans les 6 mois après administration de produits sanguins et/ou ;
	Signes cliniques d'une infection chronique au moment du don ou pendant une clarification de look back.	Dépistage de l'Ag HBs et/ou séroconversion anti-HBc et/ou dépistage d'IgM anti-HBc et/ou de l'ADN du VHB dans les 6 mois après administration de produits sanguins.
VHC	Signes cliniques lors du don et/ou séroconversion dans les 6 mois suivant le don et/ou dépistage de l'Ag VHC core et/ou du NAT VHC pos.	Signes cliniques d'une infection récente par le VHC jusqu'à 6 mois suivant l'administration de produits sanguins et/ou ;
		Séroconversion anti-VHC dans un délai de 6 mois et/ou ;
		Apparition du RNA du VHC dans un délai de 6 mois après administration de produits sanguins.