



Transfusion CRS

Change File Book – Critères d’aptitude au don de sang

Version 2.0

En vigueur dès le 01.02.2025

Allergie alimentaire	CAT : CIT si symptomatique. Se référer à Maladies allergiques. Définition: Réaction allergique à un aliment particulier.
Anaphylaxie	Nouvelle critère
Anémie falciforme	Anémie falciforme / Drépanocytose Nouvelle définition
Anévrisme	Nouvelle critère
Angine de poitrine	Nouvelle critère
Anticoagulant, traitement	Nouvelle critère
Artériosclérose, y c. maladie des artères coronaires (MAC)	Nouvelle critère
Asthme	CAT : Accepter si asymptomatique, même sous traitement épisodique ou préventif régulier par aérosol (y compris corticoïdes). et si une utilisation sporadique d'inhalateurs est nécessaire ou en cas de traitement préventif régulier avec des aérosols (y compris des aérosols de corticostéroïdes). CIT si traitement corticoïde oral, jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement. Nouvelle définition
Cancer	CAT: En acte thérapeutique "immunothérapie" remplacée par "hormonothérapie" CID "Cancer hématologique" et "Cancer associés à des virémies" supprimé



Chirurgicale, intervention (Généralités)	<p>CAT : CIT:</p> <ul style="list-style-type: none">• jusqu'à guérison complète (et la fin d'un traitement post-opératoire);• compter 2 semaines supplémentaires après la fin d'un traitement antibiotique;• compter 1 mois supplémentaire après la fin d'un traitement préventif par anticoagulants (sous-cutané);• compter 3 mois supplémentaires après la dernière prise d'anticoagulants oraux;• de 1 mois après intervention mineure sans complications;• de 4 mois après la chirurgie dans les pays où les taux de VIH, VHB, VHC sont élevés;• de 6 à 12 mois après intervention majeure (selon évaluation par le médecin du SRTS).
Conjonctivite allergique	<p>CAT : Accepter (si les yeux ne sont pas gravement rouges) Nouvelle référence "Aller à" "Maladies allergiques"</p>
Désensibilisation, injections de	<p>Nouvelle définition</p>
Diabète sucré	<p>CAT : Accepter si diabète de type 2 contrôlé par traitement diététique assorti ou non d'antidiabétiques oraux, en l'absence de complication et de signes d'infection. Accepter si sous traitement diététique avec ou sans antidiabétiques oraux, bien contrôlé et sans lésions organiques.</p> <p>Accepter en cas de traitement parentéral (sauf insulinothérapie) si:</p> <ul style="list-style-type: none">• absence de signes d'infection et d'autres anomalies de la peau aux sites d'injection,• les critères sont ci-dessus remplis,• détermination de l'aptitude par le médecin du SRTS, lors du premier don. <p>CIT si diabète instable ou atteinte organique.</p> <p>CID si diabète insulino-dépendant, ou autres médicaments parentéraux.</p>
Eczéma	<p>CAT :</p> <p>Accepter si :</p> <ul style="list-style-type: none">• la lésion est peu étendue.• le site de ponction n'est pas touché.• le traitement est exclusivement local.• la zone concernée est circonscrite et• le site de ponction n'est pas touché et• aucun traitement n'est requis, ou tout au plus un traitement local (topique). <p>CIT si plaie ouverte.</p> <p>CIT si plaie ouverte, jusqu'à cicatrisation. CIT si traitement corticoïde oral, jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement.</p> <p>Nouvelle définition</p>



Endométriose	CAT : Nouveau: CIT de 2 mois après la dernière prise de médicaments contenant de l'acétate de leuproréline (tératogène).
Erythème infectieux / "cinquième maladie"	Nouvelle critère
Fracture simple	CAT : CIT d'1 mois après retrait du plâtre. CIT d'1 mois après arrêt de l'anticoagulation préventive (sous-cutanée) et/ou ablation retrait du plâtre si traitement conservateur (plâtre circulaire). CIT de 3 mois après la dernière prise d'anticoagulants oraux.
Hémochromatose	CAT : CID si lésions viscérales (excepté l'arthropathie) nécessitant un traitement par saignées.
Hémoglobinopathies	En relation avec (Nouveau): Thalassémie et Anémie falciforme Nouvelle définition
Herpès labial	Nouvelle définition
Hypertension artérielle pulmonaire	Nouveau critère Auparavant CID "Maladies cardiovasculaires" supprimé
Infarctus du myocarde	Aller à "Maladies cardiovasculaires" supprimé, CID directe
Insuffisance cardiaque	Aller à "Maladies cardiovasculaires" supprimé, CID directe
Kyste(s) ovarien(s)	Nouvelle référence "Aller à" du "syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)" Traitement: Accepter si fonction rénale normale. En cas d'affection maligne, même conduite à tenir traitement que pour le critère "cancer". Définition: Tumeur(s) bénigne(s) remplie(s) de liquide au niveau de l'ovaire, souvent sans cause pathologique. A respecter: Maladies associées (reins polykystiques ou autre).
Kyste(s) rénal/aux	Nouvelle critère



Maladies allergiques	<p>CAT: Accepter si actuellement aucun symptôme ou seulement des symptômes légers (grade 1) avec ou sans traitement Behandlung (local, antihistaminique, en aérosol).</p> <p>CIT si symptômes de grade 2, jusqu'à régression des symptômes.</p> <p>CIT si traitement corticoïde oral, jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement.</p> <p>CIT si traitement immunosuppresseur (p. ex. par anticorps monoclonal [anti-IgE]), jusqu'à 1 an après la fin du traitement.</p> <p>CIT si symptômes de grade 3 ou 4, jusqu'à 2 semaines après rétablissement complet.</p> <p>CIT si allergie de contact à du matériel utilisé pour le pré-lèvement sanguin (désinfectant pour les mains, gants, pansement adhésif) en l'absence de produit de remplacement sur place.</p> <p>CIT jusqu'à disparition des symptômes si allergie saisonnière de gravité moyenne.</p> <p>CIT si allergie chronique grave. En cas de doute, associer le cas échéant le médecin du SRTS à l'évaluation.</p> <p>Voir aussi supprimé.</p> <p>Allergie médicamenteuse nouvellement sur l'allergie</p> <p>Définition:</p> <p>Réaction d'hypersensibilité, c.-à-d. réponse inadaptée du système immunitaire à une substance habituellement inoffensive.</p> <ul style="list-style-type: none">• Degré de gravité et nature des symptômes:• Grade 1: prurit, érythème, urticaire, angioœdème• Grade 2: grade 1, rhinorrhée (écoulement nasal), enrouement, dyspnée, nausées, vomissement, tachycardie, hypotension, troubles du rythme cardiaque• Grade 3: grade 1, vomissement, œdème des voies respiratoires supérieures, bronchospasme, choc• Grade 4: grade 1, vomissement, arrêt respiratoire, arrêt cardiaque
Maladies cardio-vasculaires	<p>CAT : Accepter si cardiopathie maladie congénitale bénigne ou prolapsus mitral asymptomatique, (ex. Malformation bénigne opérée sans complication et sans antibiothérapie prophylactique).</p> <p>CID nouveau: Maladie coronarienne</p> <p>Traitement: Correction linguistique et formatage modifiés</p>
Maladies infectieuses, contact	CAT : CIT: 4 semaines remplacées par un mois
Mastocytose	Nouvelle critère



Migraine	<p>CAT : CIT d'1 mois après la prise de dihydroergotamine (Dihydrogot® et Cefergot®; retrait de l'autorisation en Suisse).</p> <p>CIT d'1 mois après la dernière prise de médicaments contenant du topiramate (tératogène).</p>
Obésité, traitement parentéral	Nouvelle critère
Oreillons	Nouvelle critère
Pacemaker	Aller à "Maladies cardiovasculaires" supprimé, CID directe.
Produit de contraste	Nouvelle critère
Rhume des foins	<p>CAT :CIT si symptomatique durant la saison de pollinisation.</p> <p>Aller à Maladies allergiques</p> <p>Voir aussi Maladies allergiques</p> <p>Définition: Allergie saisonnière au pollen affectant principalement la conjonctive et la muqueuse nasale.</p>
Rougeole	<p>CAT : CIT d'1 mois après guérison complète.</p> <p>Nouvelle référence: Maladies infectieuses,contact</p> <p>Nouvelle définition</p>
Rubéole	Nouvelle critère
Thalassémie	<p>CAT : Nouveau: CID si thalassémie majeure ou intermédiaire.</p> <p>Nouvelle définition</p>
Thrombose coronarienne	Aller à "Maladies cardiovasculaires" supprimé, CID directe
Transgender / Personne trans	<p>CAT : Aptitude à déterminer par le médecin du SRTS</p> <p>CIT pendant la phase de transition médicale.</p> <p>Nouveau: Voir aussi: Chirurgicale, intervention (Généralités)</p> <p>Nouvelle définition</p> <p>A respecter: Les personnes transgenres, en particulier les hommes qui se sont transformés en femmes, courent un risque accru d'infection au VIH selon des études internationales. Aucune étude n'a été réalisée sur la prévalence du VIH chez les personnes transgenres en Suisse. Il convient donc d'accorder la plus grande attention au comportement sexuel ou autre comportement à risque chez les personnes transgenres.</p>
Traumatisme crânio-cérébral (TCC)	<p>Nouvelle critère</p> <p>Nouvelle référence "Aller à" du ""Commotion cérébrale" et "Blessure à la tête"</p>



Trouble bipolaire	CAT : Nouveau: CIT d'1 mois après la dernière prise de médicaments contenant de l'acide valproïque ou de la carbamazépine (téatogènes). Trouble affectif -bipolaire Définition: Anciennement maladie trouble maniaco-dépressive. A respecter:
Troubles du rythme cardiaque	Référence de "Se référer à ": Fibrillation (Nouveau) Rebaptisé de: Arythmie (Nouveau: En relation avec Arythmie) Accepter après ablation, si réussie -efficace avec succès , rétablie et sans médicaments. Nouveau: CID si fibrillation auriculaire, même traitée par des médicaments.
Urticaire	CAT : CIT si urticaire généralisé, jusqu'à guérison complète . (durée de la CIT à déterminer par le médecin du STRS).
Varicelle	Nouvelle critère
Zona	En relation avec : Maladies infectieuses, contact Nouvelle définition

Les renvois aux chapitres « Chapitre 17 E/F/D » ont été complétés par « Annexe Art. 7.1/7.2/7.3 ».