

# Capitolo 17D / Allegato Art. 7.3

## Vaccine Check - Check vaccinale

Valido da: 01/10/2023  
versione 6

Per la donazione di cellule staminali (CT/VT e MC) si applicano gli stessi termini di rinvio della donazione di sangue (prelievo: contattare SBSC).

Legenda aggiunto modificato cancellato

### Tossoidi e vaccini inattivati o a base proteica o basati su vettori non replicativi o vaccini mRNA

COVID-19	Comirnaty® di Pfizer/BioNTech	48 ore
COVID-19	COVID-19 Vaccine Moderna®	48 ore
COVID-19	COVID-19 Vaccine Janssen, Johnson & Johnson	48 ore
COVID-19	Nuvaxovid von Novavax	48 ore
Cancro cervicale / verruche genitali (virus del papilloma umano / HPV)	Gardasil®, Cervarix®	48 ore
Carbonchio (Antrace)		48 ore
Colera		48 ore
Difterite (singolo o combinato)		48 ore
Encefalite giapponese	Ixiaro®	48 ore
Epatite A (singolo o combinato)	Singolo o combinato	2 settimane
Epatite B (singolo o combinato)	Singolo o combinato	2 settimane
Herpes genitale	Lupidon®	48 ore
Influenza (stagionale)		48 ore
Meningite (causata da Haemophilus influenzae tipo b)		48 ore
Meningite causata da meningococchi (meningite meningococcica)		48 ore
Meningoencefalite da zecche	FSME-Immun®, Encepur N®	48 ore
Pertosse (singolo o combinato)		48 ore
Polio (Poliomielite, vaccino parenterale di Salk) (singolo o combinato)		48 ore
Polmonite causata da pneumococchi (polmonite da pneumococco)		48 ore
Rabbia	Rabipur®	48 ore
Tetano (singolo o combinato)		48 ore
Varicella zoster	Shingrix®	48 ore

### Vaccini vivi attenuati o basati su vettori replicativi

Colera	Dukoral®	4 settimane
Febbre gialla	Stamaril®	4 settimane
Herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio)	Zostavax®	4 settimane
Morbillo-parotite-rosolia		4 settimane
Morbillo-parotite-rosolia-varicella	Proquad®	4 settimane
Rosolia (singolo o combinato)		4 settimane
Rotavirus	Rotarix®	4 settimane
Tifo / Paratifo (orale)	Vivotif®	4 settimane
Tubercolosi (BCG)		4 settimane
Varicella		4 settimane

### Immunizzazione passiva post-esposizione (immunoglobuline)

Rabbia	Berirab®	12 mesi
Tetano	Tetagam®	12 mesi

### Vaccino con albumina umana

Rabbia	Vaccino antirabbico Mérieux®	12 mesi
--------	------------------------------	---------

### Vaccini non autorizzati

Periodo di attesa di 12 mesi		
------------------------------	--	--