

A	Sintomi locali – riferiti alla puntura		
A1	Lesione di vasi sanguigni (stravaso ematico, accumulo di sangue nei tessuti)		
A1.1	Ematoma venoso (comparsa nel centro di donazione)	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Localmente nel punto della puntura con:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Gonfiore</li> <li>Dolore</li> <li>Colorazione cutanea (ematoma)</li> <li>Estensione &lt; 50 mm</li> </ul> </li> </ul>
		Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estensione &gt; 50 mm</li> <li>Compromissione funzionale o dolorosa</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accertamento presso la/lo specialista</li> </ul>
A1.2	Iniezione arteriosa	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dolore nel punto della puntura</li> <li>Colore chiaro del sangue</li> <li>Rapido riempimento della sacca di sangue</li> <li>Movimento dell'ago dovuto alla pulsazione arteriosa</li> <li>Estensione dell'ematoma &lt; 50 mm</li> </ul>
		Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dolori più forti, per lungo tempo</li> <li>Estensione dell'ematoma tra &gt; 50 e &lt; 100mm</li> <li>Compromissione funzionale o dolorosa</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accertamento presso la/lo specialista</li> </ul>
A1.3	Ematoma ritardato (Comparsa fuori dal centro di donazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo la puntura venosa o arteriosa</li> <li><i>Classificazione della gravità come sopra</i></li> </ul>	
A2	Lesioni di altre strutture anatomiche (dolore)		

	Irritazione del nervo / lesione del nervo	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte dolore immediato al momento dell'iniezione o del ritiro dell'ago</li> <li>• Irradiazione del dolore</li> <li>• Parestesie</li> <li>• Disturbi per &lt; 2 settimane</li> </ul>
A2.1		Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disturbi per &gt; 2 settimane, &lt; 1 anno</li> <li>• Paresi sensibile locale</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disturbi per &gt; 1 anno</li> <li>• Paresi motorie</li> <li>• Accertamento presso la/lo specialista</li> </ul>
A2.2	Dolore non specifico al braccio	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolore locale o irradiato</li> <li>• Dolore immediato o ritardato</li> <li>• Nessuna assegnazione a una delle categorie descritte qui sopra</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesione tendinea tramite l'ago</li> <li>• Dolore intenso, locale, non irradiato</li> </ul>

A3	Infezione locale/infiammazione		
A3.1	(Trombo)flebite	Grado 2	• Ipertemia, dolore, arrossamento e gonfiore
		Grado 3	• Con formazione di trombi, ev. con febbre
A3.2	Cellulite, dermatite localizzata	Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gonfiore, arrossamento e dolore</li> <li>• Infezione non venosa</li> </ul>
		Grado 3	• Erisipela
A4	Altre malattie vascolari gravi		

A4.1	Trombosi venosa profonda (DVT)		
A4.2	Fistola arterio-venosa		
A4.3	Sindrome compartimentale		
A4.4	Pseudoaneurisma dell'arteria brachiale	Grado 3	
B	Sintomi generalizzati/reazioni vasovagali		
B1-B5*	Nel centro di donazione		
	RWV SENZA lesione:	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malessere, debolezza, paura, vertigini</li> <li>• Pallore, sudorazione, nausea (episodio presincopale)</li> <li>• Breve perdita di coscienza (sincope, collasso) &lt; 60 sec.</li> <li>• Abbassamento della pressione e indebolimento del polso</li> <li>• Recupero spontaneo</li> </ul>
		Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vomito, incontinenza, spasticità</li> <li>• Sincope recidivante</li> <li>• Recupero lento</li> <li>• Perdita di coscienza (sincope, collasso) &gt; 60 sec.</li> <li>• Intervento necessario, p. es. reintegrazione di liquidi</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recupero lentissimo</li> <li>• Trasferimento al pronto soccorso</li> <li>• Rianimazione</li> </ul>
	RWV CON lesione:	Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sincope con caduta o incidente e lesione locale</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sincope con caduta o incidente e grave trauma</li> </ul>
	Fuori dal centro di donazione		

\* Definizioni:

- B1      NESSUNA perdita di coscienza  
B2      CON perdita di coscienza < 60 sec. SENZA lesione  
B3      CON perdita di coscienza < 60 sec. CON lesione  
B4      CON perdita di coscienza > 60 sec. SENZA lesione  
B5      CON perdita di coscienza > 60 sec. CON lesione

B6	RVV Senza lesione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Classificazione della gravità come sopra</i></li> </ul>
B7	RVV con lesione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Classificazione della gravità come sopra</i></li> </ul>

C	Effetti collaterali specifici dell'aferesi		
	Reazione al citrato	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parestesia periorale (formicolio), formicolio alla punta delle dita, vampate di calore</li> <li>• Gusto metallico in bocca</li> </ul>
C1		Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parestesia più marcata</li> <li>• Con nausea e vomito</li> <li>• Interruzione della donazione, ev. Ca per e.v.</li> </ul>
		Grado 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetania o crampi</li> <li>• Aritmia cardiaca</li> </ul>
C2	Emolisi	Grado 3	

C3	Embolia gassosa	Grado 3	
C4	Infiltrazione	Grado 2	
D	Reazioni allergiche		
D1	Reazione allergica localizzata	Grado 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esantema, gonfiore, prurito nel sito della puntura</li> </ul>
D2	Reazione generalizzata/anafilassi	Grado 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rossore improvviso generalizzato o orticaria senza interessamento degli organi</li> <li>• Altri sintomi, p. es. calo di pressione, difficoltà respiratorie, vomito ecc.</li> </ul>
		Grado 3	Shock anafilattico
E	Altre reazioni serie		
E1	Sintomi cardiaci acuti p. es. angina pectoris	Grado 3	
E2	Infarto miocardico		
E3	Arresto cardiaco		
E4	TIA		
E5	Evento cerebrovascolare		
E6	<b>DECESSO</b>	Grado 4	
F	Altri effetti collaterali seri, i problemi segnalati raramente devono essere specificati		