

## Generalità

In linea di massima, l'assunzione di medicinali non costituisce una controindicazione per la donazione di sangue.

1. In una prima fase occorre verificare per quale malattia sottostante viene assunto il medicinale e se la malattia sottostante implica una controindicazione temporanea o definitiva dalla donazione. In questo caso si deve procedere come indicato nei «Criteri d'attitudine alla donazione di sangue» (allegato articolo 7). In questo capitolo sono elencati i riferimenti ai criteri di idoneità alla donazione per i vari gruppi terapeutici.
  2. Accettare la donazione se
    1. applicazione topica (attenzione -> applicazione estesa di steroidi)
    2. assunzione sporadica o automedicazione con determinati medicinali come vitamine, prodotti omeopatici, anticoncezionali, antidolorifici, sonniferi, a condizione che il donatore sia sano e che siano seguite le procedure previste dal presente capitolo.
- **Attenzione:** se negli ultimi 5 giorni è stato assunto un medicinale che influisce sulla funzione piastrinica, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici.
  - **CIT in caso di assunzione di medicinali,**
    1. che compromettono la funzione piastrinica (vedi inibitori dell'aggregazione Tc, ad es. acido acetilsalicilico): se negli ultimi 5 giorni è stato assunto un medicinale che influisce sulla funzione piastrinica, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici;
    2. che si sono dimostrati teratogeni: derivati della vitamina A (Roaccutan®, Acitretin, Neotigason®, Etreinat®), finasteridi (Propecia®, Proscar®), sali di litio (Lithiofor®, Quilonorm®), alcaloidi della segale cornuta (Dihyergot®, Cafergot®), vismodegib (Erievedge®), inibitori della 5-alfa-reduttasi (dutasteride (Avodart®)), metotrexato, clomifene (Clomid®) e derivati della cumarina. Le CIT per questi medicinali sono indicati in questo capitolo e tra i criteri rilevanti di idoneità alla donazione.
  - **CID in caso di**
    1. medicinali autoiniettati non prescritti dal medico
    2. droghe autoiniettate.

Se un medicinale non è incluso nell'elenco ma le sue proprietà rendono opportuno una CIT secondo il punto 3), si raccomanda una CIT pari a 5 volte l'emivita. In caso di dubbio, rivolgersi al medico del STR.

Procedura	
Controindicazione definitiva (CID)	Misura di durata illimitata e di solito irreversibile. Il donatore deve essere informato in modo comprensibile.
Controindicazione temporanea (CIT)	Misura di durata limitata. Il donatore deve sapere quando e perché sarà riammesso.
Accettare	Il donatore è ammesso alla donazione.

## Elenco dei medicinali

La seguente tabella contiene un elenco di vari medicinali, suddivisi per gruppi terapeutici, con indicazione dei rispettivi dei principi attivi o dei nomi commerciali e delle procedure da seguire con riferimento al capitolo «Criteri d'attitudine alla donazione di sangue». Gli elenchi dei nomi commerciali non sono esaustivi. A questo proposito si rimanda alla piattaforma di [Swissmedic](#) (AIPS) o, per i medicinali stranieri, a [pharmawiki](#).

Gruppi terapeutici	Principi attivi e/o nomi dei preparati	Procedura
--------------------	--	-----------

Anticoagulanti	<b>Generale</b>	La decisione sull' idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
	<b>Bloccante del recettore ADP</b> (recettore dell' adenosina difosfato, P2Y <sub>12</sub> ): Clopidogrel (ad es. Plavix®/ DuoPlavin®) Prasugrel (Efient®) Ticagrelor (Brillique®)	Nota bene: poiché la funzione piastrinica è compromessa, l' unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici se il medicinale è stato assunto negli ultimi 5 giorni.
	<b>Antiaggreganti.</b> <b>Prostaglandine:</b> Iloprost (Ilomedin®) Prostaciclina (Flolan®)	
	<b>Inibitori della COX-1:</b> ASA (Aspirina®, Aspirina Cardio®, ASA Cardio Spirig® 100, Cardiax®-ASS, Kardégic®) +Clopidogrel: DuoPlavin® 200/25mg retard	
	<b>Antagonisti del fattore Xa:</b> Edoxaban (Lixiana®) Fondaparinux (Arixtra®) Rivaroxaban (Xarelto®) Apixaban (Eliquis®) <b>Inibitori della glicoproteina IIb/IIIa:</b> Abciximab (Reopro®) Eptifibatide (Integrilin®) Tirofiban (Aggrastat®) <b>Eparine</b> <b>Antagonisti della trombina:</b> Dabigatran (Pradaxa®) Bivalirudina (Angiox®) Argatroban (Argatra®)	Vedere anticoagulanti in generale.
	<b>Antagonisti della vitamina K /cumarine:</b> Fenprocumone (Marcoumar®) Acenocumarolo (Sintrom®)	CIT di 3 mesi dopo l' ultima assunzione (teratogeno).

<p>Analgesici / Antireumatici / Antidolorifici / Analgesici non oppioidi</p>	<p><b>Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS):</b></p> <p><b>Derivati dell'acido antranilico, fenamati:</b> Acido mefenamico (ad es. Mefenacid®, Spiralgin®, Ponstan®)</p> <p><b>Inibitori della COX-2:</b> Celecoxib (Celebrex®, Celecoxib Pfizer®) Etoricoxib (Arcoxia®)</p> <p><b>Derivati dell'acido acetico e derivati dell'acido indoloacetico:</b> Acemetacina (Tilur/Tilur retard) Bufexamac (Parfenac®) Diclofenac (ad es. Voltaren®, Diclofenac Actavis) Etodolac (Lodine®/retard) Indometacina (ad es. Indocid®-retard, Elmetacin®) Ketorolac (Acular®, Tora-dol®, KetoVision®)</p> <p><b>Oxicam:</b> Lornoxicam (Xefo®) Meloxicam (Mobicox®) Piroxicam (ad es. Felden®, Pirozol) Tenoxicam (Tilcotil®)</p> <p><b>Derivati dell'acido propionico:</b> Ibuprofene (ad es. Algifor®, Brufen®) Dexibuprofene (Seractil®) Naprossene (ad es. Aleve®, Proxen®) Dexketoprofene (Kettesse®) Flurbiprofene (ad es. Froben®)</p> <p><b>Salicilati (ASA)</b> Acido acetilsalicilico/ Carbossilato di calcio/ Acetilsalicilato di lisina / vari (ad esempio Aspirina®, Aspegic®, Alca C®, Alcacyl® compresse, ASA tabs, Kardégic®, Tiatral®, Dolopirin®).</p> <p><b>Altri:</b> Nimesulide (Aulin®, Nisulid®)</p>	<p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Nota bene: poiché la funzione piastrinica è compromessa, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici se il medicinale è stato assunto negli ultimi 5 giorni.</p>
--	---	---

Analgesici / Antireumatici / Antidolorifici / Analgesici non oppioidi	<b>Anilidi:</b> Paracetamolo (ad es. Dafalgan®, Panadol®, Dololur®) <b>Pirazoloni:</b> Metamizolo (Minalgin®, Novalgina®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antiallergici (antistaminici)	<b>Antistaminici</b> Cetirizina Streuli®, Hista-X, Zyrtec®, Telfast®, Claritine®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antianemici	Preparati di ferro i.v. Preparati di ferro p.o. Eritropoietina	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antinfettivi	Antibiotici	CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante. Agli antibiotici per la terapia dell'acne si applica una regola speciale.
	Antimicotici	CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.
	Antiparassitari / Antiprotozoari	CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante. Profilassi della malaria: accettare prima del viaggio.
	Virostatici (ad es. Zovirax®, Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®)	CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante. Nota bene: Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®: profilassi pre-esposizione (PrEP) e profilassi post-esposizione (PEP): CIT di 4 mesi dopo la fine del trattamento PEP/ PrEP.
Antidepressivi	Litio	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Litio: CIT di 1 settimana dopo l'ultima assunzione (teratogeno).
Antidiabetici	Antidiabetici orali Insuline (ad es. Humalog®, NovoRapid®, Lantus®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antipertensivi		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ansiolitici	Benzodiazepine (ad es. Xanax®, Temesta®, Tranxilium®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.

Gocce oculari		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Dermatologici	Medicinali sistemici per l'acne: retinoidi (ad esempio Curakne® Isotretinoina, Liderma, Roaccutan®, Tretinac®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.  Isotretinoina (Curakne®, Isotretinoina, Roaccutan® capsule, Tretinac®), tretinoina (Vesanoid®) o alitretinoina (Toctino®): CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione (teratogeno).  Etretinato (attualmente non omologato in Svizzera): CIT di 2 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).
Dermatologici	Antipsoriasici: acitretina (Neotigason®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.  Acitretina (Neotigason®): CIT di 3 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).
Diuretici		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ferro		Decisione sull'idoneità alla donazione lasciata alla discrezionalità del medico del STR.
Disassuefanti	Nicotina: Zyban®	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Disassuefanti	Alcool: Antabus®, Campral® e derivati	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Antigottosi	Uricostatici (ad es. Allopur®, Allopurinolo®, Mephanol®, Zyloric®)  Uricosurici (Santuril®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ormoni	Medicinali tireostatici (Neo-Mercazol®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ormoni	Ormoni tiroidei (ad es. Eltroxin®, tiroxina)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ipnotici / Sedativi Sonniferi	Barbiturici  Benzodiazepine (ad es. Dalmadorm®, Dormicum®, Rohypnol, Zolpidem Streuli®)  Preparati fitoterapici	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.



Immunologici	Bio-immunologici Preparati batterici (ad es. Broncho-Vaxom <sup>®</sup> , Uro-Vaxom <sup>®</sup> , Buccalin <sup>®</sup> , Luivac <sup>®</sup> , Ribomunyl <sup>®</sup> ) Preparati di origine umana (ad es. Cytotect <sup>®</sup> , Hepatect <sup>®</sup> , vaccino passivo antirabbico e antitetanico, Varitect <sup>®</sup> ). Preparati di origine animale/terapia cellulare (ad es. preparati di origine bovina come in passato Solcoseryl <sup>®</sup> ).	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Immunosoppressori	Immunosoppressori: metotrexato	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Metotrexato: CIT di 12 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno).
Cardiovascolari	ACE-inibitori (ad es. captopril, Captosol <sup>®</sup> , enalapril, Reniten <sup>®</sup> , ramipril, Triatec <sup>®</sup> ) Alfabloccanti (ad es. doxazosina, urapidil) Antagonisti dell'angiotensina II (ad es. losartan, Coasaar <sup>®</sup> , valsartan, Diovan <sup>®</sup> ) Betabloccanti (ad es. metoprololo, Beloc <sup>®</sup> , bisoprololo, Concor <sup>®</sup> ) Calcioantagonisti (ad es. amlodipina, Norvasc <sup>®</sup> , nifedipina, Adalat <sup>®</sup> ) Glicosidi cardiaci Digoxin <sup>®</sup>	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Cardiovascolari	Antiaritmici (ad es. Isoptin <sup>®</sup> )	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Contraccettivi		Accettare.
Medicinali contro la caduta di capelli	Alocapil <sup>®</sup> , Finacapil <sup>®</sup> , Finasterid <sup>®</sup> o Propecia <sup>®</sup> .	Alocapil <sup>®</sup> , Finacapil <sup>®</sup> , Finasterid <sup>®</sup> o Propecia <sup>®</sup> : CIT di 1 mese dopo l'ultima dose (teratogeno).
Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni	Clomifene (Clomid <sup>®</sup> )	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Clomifene (Clomid <sup>®</sup> ): CIT di 6 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).
Oncologici	Vismodegib (Erivedge <sup>®</sup> )	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Vismodegib (Erivedge <sup>®</sup> ): CIT di 2 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).



Psicostimolanti	Metilfenidato (Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Ritalin®)	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Urologici	Medicinali per la prostata: Inibitori della 5-alfa-reduttasi: dutasteride (Avodart®) Dutasteride+tamsulosina (Duodart®), finasteride (Finasterix®, finasteride, Proscar®). Pradif®, Tamsulosin T-Mepha®retard).	La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Finasteride o Proscar®: CIT di 1 mese dopo l'ultima dose (teratogeno). Dutasteride (Avodart®) o dutasteride/tamsulosina (Duodart®): CIT di 6 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno).
Urologici	Disfunzione erettile: ad esempio, Viagra®.	Accettare.
Vasodilatatori		La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.
Ormone della crescita		CID in caso di trattamento con ormoni derivati da tessuti umani. MCJ