

Generalità

In linea di massima, l'assunzione di medicinali non costituisce una controindicazione per la donazione di sangue.

1. In una prima fase occorre verificare per quale malattia sottostante viene assunto il medicinale e se la malattia sottostante implica una controindicazione temporanea o definitiva dalla donazione. In questo caso si deve procedere come indicato nei «[Criteri d'attitudine alla donazione di sangue](#)» (allegato articolo 7). In questo capitolo sono elencati i riferimenti ai criteri di idoneità alla donazione per i vari gruppi terapeutici.
2. Accettare la donazione se
 - a. applicazione topica (attenzione -> applicazione estesa di steroidi)
 - b. assunzione sporadica o automedicazione con determinati medicinali come vitamine, prodotti omeopatici, anticoncezionali, antidolorifici, sonniferi, a condizione che il donatore sia sano e che siano seguite le procedure previste dal presente allegato.
 - Attenzione: se negli ultimi 5 giorni è stato assunto un medicinale che influisce sulla funzione piastrinica, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici.
3. CIT in caso di assunzione di medicinali,
 - a. che compromettono la funzione piastrinica (vedi esempi alla voce inibitori dell'aggregazione Tc e FANS): se negli ultimi 5 giorni è stato assunto un medicinale che influisce sulla funzione piastrinica, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici;
 - b. che contengono principi attivi teratogeni: Acenocumarolo, Acitretina, Alitretinoina, Anastrozolo, Carbamazepina, Carbimazolo, Clomifene, Ciclofosfamide, Danazolo, Dietilstilbestrolo, Dutasteridum, Eslicarbatsepina, Etretinato, Finasteride, Fluindione, Isotretinoina, Letrozolo, Leuprorelinum, litio, metotrexato, mifepristone, misoprostolo, acido micofenolico, penicillamina, fenobarbital e farmaci simili, fenprocumone, fenitoina, tamoxifene, topiramato, tretinoina, acido valproico, verteporfina, vismodegibum e warfarin. Le indicazioni e gli esempi di nomi di preparati sono riportati nell'elenco dei farmaci. L'elenco sopracitato viene revisionato annualmente dal T-CH e aggiornato in consultazione con il gruppo di lavoro BSH [R8]. Le CIT per questi medicinali sono indicati nell'allegato art. 7.1 e nei relativi [criteri di attitudine](#) alla donazione.
4. CID in caso di
 - a. medicinali autoiniettati non prescritti dal medico
 - b. droghe autoiniettate.

| Procedura | |
|------------------------------------|--|
| Controindicazione definitiva (CID) | Misura di durata illimitata e di solito irreversibile. Il donatore deve essere informato in modo comprensibile. |
| Controindicazione temporanea (CIT) | Misura di durata limitata. Il donatore deve sapere quando e perché sarà riammesso. |
| Accettare | Il donatore è ammesso alla donazione. |

Elenco dei medicinali

La seguente tabella contiene un elenco di vari medicinali, suddivisi per gruppi terapeutici, con indicazione dei rispettivi principi attivi o dei nomi commerciali e delle procedure da seguire con riferimento al capitolo «[Criteri d'attitudine alla donazione di sangue](#)». Gli elenchi dei nomi commerciali non sono esaustivi. A questo proposito si rimanda alla piattaforma di [Swissmedic](#) (AIPS) o, per i medicinali stranieri, a [pharmawiki](#).

| Gruppi terapeutici | Principi attivi e/o nomi dei preparati | Procedura |
|--------------------|--|--|
| Anticoagulanti | Generale | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| | Bloccante del recettore ADP (recettore dell'adenosina difosfato, P2Y ₁₂): Clopidogrel (ad es. Plavix®/ DuoPlavin®) Prasugrel (Efient®) Ticagrelor (Brillique®) | Nota bene: poiché la funzione piastrinica è compromessa, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici se il medicinale è stato assunto negli ultimi 5 giorni. |
| | Antiaggreganti. Prostaglandine: Iloprost (Ilomedin®) Prostaciclina (Flolan®) | |
| | Inibitori della COX-1: ASA (Aspirina®, Aspirina Cardio®, ASA Cardio Spirig® 100, Cardiax®-ASS, Kardégic®) +Clopidogrel: DuoPlavin® 200/25mg retard | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Antagonisti del fattore Xa:</p> <p>Edoxaban (Lixiana®) Fondaparinux (Arixtra®) Rivaroxaban (Xarelto®) Apixaban (Eliquis®)</p> <p>Inibitori della glicoproteina IIb/IIIa:</p> <p>Abciximab (Reopro®) Eptifibatide (Integrilin®) Tirofiban (Aggrastat®)</p> <p>Eparine</p> <p>Antagonisti della trombina:</p> <p>Dabigatran (Pradaxa®) Bivalirudina (Angiox®) Argatroban (Argatra®)</p> | <p>Vedere anticoagulanti in generale.</p> |
| | <p>Antagonisti della vitamina K /cumarine:</p> <p>Fenprocumone (Marcoumar®) Acenocumarolo (Sintrom®) Warfarin (Coumadin®) Fluindione (Previscan®)</p> | <p>CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno).</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Analgesici / Antireumatici / Antidolorifici / Analgesici non oppioidi</p> | <p>Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS):</p> <p>Derivati dell'acido antranilico, fenamati: Acido mefenamico (ad es. Mefenacid[®], Spiralgin[®], Ponstan[®])</p> <p>Inibitori della COX-2: Celecoxib (Celebrex[®], Celecoxib Pfizer[®]) Etoricoxib (Arcoxia[®])</p> <p>Derivati dell'acido acetico e derivati dell'acido indoloacetico: Acemetacina (Tilur/Tilur retard) Bufexamac (Parfenac[®]) Diclofenac (ad es. Voltaren[®], Diclofenac Actavis) Etodolac (Lodine[®]/retard) Indometacina (ad es. Indocid[®]-retard, Elmetacin[®]) Ketorolac (Acular[®], Tora-dol[®], KetoVision[®])</p> <p>Oxicam: Lornoxicam (Xefo[®]) Meloxicam (Mobicox[®]) Piroxicam (ad es. Felden[®], Pirosol) Tenoxicam (Tilcotil[®])</p> <p>Derivati dell'acido propionico: Ibuprofene (ad es. Algifor[®], Brufen[®]) Dexibuprofene (Seractil[®]) Naprossene (ad es. Aleve[®], Proxen[®]) Dexketoprofene (Kettesse[®]) Flurbiprofene (ad es. Froben[®])</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Nota bene: poiché la funzione piastrinica è compromessa, l'unità donata non può essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici se il medicinale è stato assunto negli ultimi 5 giorni.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Salicilati (ASA)</p> <p>Acido acetilsalicilico/ Carbossilato di calcio/ Acetilsalicilato di lisina / vari (ad esempio Aspirina®, Aspegic®, Alca C®, Alcacyl® compresse, ASA tabs, Kardégic®, Tiatral®, Dolopirin®).</p> <p>Altri:</p> <p>Nimesulide (Aulin®, Nisulid®)</p> | |
| <p>Analgesici / Antireumatici / Antidolorifici / Analgesici non oppioidi</p> | <p>Anilidi:</p> <p>Paracetamolo (ad es. Dafalgan®, Panadol®, Dololur®)</p> <p>Pirazoloni:</p> <p>Metamizolo (Minalgin®, Novalgina®)</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> |
| <p>Antiallergici (antistaminici)</p> | <p>Antistaminici</p> <p>Cetirizina Streuli®, Hista-X, Zyrtec®, Telfast®, Claritine®)</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> |
| <p>Antianemici</p> | <p>Preparati di ferro i.v. Preparati di ferro p.o. Eritropoietina</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> |
| <p>Antinfettivi</p> | <p>Antibiotici</p> | <p>CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.</p> <p>Agli antibiotici per la terapia dell'acne si applica una regola speciale.</p> |
| | <p>Antimicotici</p> | <p>CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante.</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | Antiparassitari / Antiprotozoari | CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante. Profilassi della malaria: accettare prima del viaggio. |
| | Virostatici (ad es. Zovirax®, Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®) | CIT di 2 settimane dopo l'ultima dose e dopo la completa guarigione, se non stabilito diversamente a causa della malattia sottostante. Nota bene: Truvada®, Isentress®, Prezista®, Norvir®: profilassi pre-esposizione (PrEP) e profilassi post-esposizione (PEP): CIT di 4 mesi dopo la fine del trattamento PEP/ PrEP. |
| Antidepressivi | Litio (Lithiofor®, Priadel retard®, Quilonorm®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Litio: CIT di 1 settimana dopo l'ultima assunzione (teratogeno). |
| Antidiabetici | Antidiabetici orali Insuline (ad es. Humalog®, NovoRapid®, Lantus®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Antipertensivi | | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Ansiolitici | Benzodiazepine (ad es. Xanax®, Temesta®, Tranxilium®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Antigottosi | Uricostatici (ad es. Allopur®, Allopurinolo®, Mephanol®, Zyloric®) Uricosurici (Santuril®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |

| | | |
|-----------------|---|--|
| Cardiovascolari | <p>ACE-inibitori (ad es. captopril, Captosol®, enalapril, Reniten®, ramipril, Triatec®)</p> <p>Alfabloccanti (ad es. doxazosina, urapidil)</p> <p>Antagonisti dell'angiotensina II (ad es. losartan, Coasaar®, valsartan, Diovan®)</p> <p>Betabloccanti (ad es. metoprololo, Beloc®, bisoprololo, Concor®)</p> <p>Calcioantagonisti (ad es. amlodipina, Norvasc®, nifedipina, Adalat®)</p> <p>Glicosidi cardiaci Digoxin®</p> | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Cardiovascolari | Antiaritmici (ad es. Isoptin®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Citostatici | Metotrexato | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Metotrexato: CIT di 12 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p> |
| Contraccettivi | | Accettare. |
| Dermatologici | Medicinali sistemici per l'acne: retinoidi (ad esempio Curakne® Isotretinoina, Roaccutan®, Tretinac®) | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Isotretinoina (Curakne®, Isotretinoina, Roaccutan® capsule, Tretinac®), tretinoina (Vesanoïd®) o alitretinoina (Toctino®): CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione (teratogeno).</p> <p>Etretinato (attualmente non omologato in Svizzera): CIT di 2 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p> |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Dermatologici | Antipsoriasici: acitretina (Neotigason®, Acicutan®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Acitretina (Neotigason®): CIT di 3 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno). |
| Diuretici | | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Disassuefanti | Nicotina: Zyban® | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Disassuefanti | Alcool: Antabus®, Campral® e derivati | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Disturbo bipolare | Acido valproico (Convulex®, Depakine® Chrono, Orfiril®, Valproat Sandoz®) Carbamazepina (Carsol®, Tegretol®, Timnoil®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Acido valproico e carbamazepina: CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione (teratogeno). |
| Emicrania | Topiramato (Topamax®, Topiramato Sandoz®, Topiramato Spirig HC®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Topiramato: CIT di 1 mese dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno). |
| Endometriosi | Leuprorelini acetato (Lucrin Depot®) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. Leuprorelini acetato: CIT di 2 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno). |
| Ferro | | Decisione sull'idoneità alla donazione lasciata alla discrezionalità del medico del STR. |
| Gocce oculari | | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Ipnotici / Sedativi Sonniferi</p> | <p>Barbiturici</p> <p>Benzodiazepine (ad es. Dalmadorm®, Dormicum®, Rohypnol, Zolpidem Streuli®)</p> <p>Preparati fitoterapici</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> |
| <p>Immunologici</p> | <p>Bio-immunologici</p> <p>Preparati batterici (ad es. Broncho-Vaxom®, Uro-Vaxom®, Buccalin®, Luivac®, Ribomunyl®)</p> <p>Preparati di origine umana (ad es. Cytotect®, Hepatect®, vaccino passivo antirabbico e antitetanico, Varitect®).</p> <p>Preparati di origine animale/terapia cellulare (ad es. preparati di origine bovina come in passato Solcoseryl®).</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> |
| <p>Medicinali contro la caduta di capelli</p> | <p>Finasteride (Alocapil®, Finacapil®, Finasterid® o Propecia®)</p> | <p>Finasteride: CIT di 1 mese dopo l'ultima dose (teratogeno).</p> |
| <p>Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni</p> | <p>Clomifene (Clomid®)</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Clomifene: CIT di 6 mesi dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p> |
| <p>Oncologici</p> | <p>Vismodegib (Erivedge®)</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Vismodegib: CIT di 2 anni dopo l'ultimo utilizzo (teratogeno).</p> |
| <p>Ormone della crescita</p> | | <p>CID in caso di trattamento con ormoni derivati da tessuti umani. MCJ</p> |
| <p>Ormoni</p> | <p>Medicinali tireostatici (Neo-Mercazol®)</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> |

| | | |
|-----------------|--|---|
| Ormoni | Ormoni tiroidei (ad es. Eltroxin [®] , tiroxina) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Psicostimolanti | Metilfenidato (Concerta [®] , Equasym [®] , Medikinet [®] , Ritalin [®]) | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |
| Urologici | <p>Medicinali per la prostata:</p> <p>Inibitori della 5-alfa-reduttasi: dutasteride (Avodart[®])</p> <p>Dutasteride+tamsulosina (Duodart[®]), finasteride (Finasterix[®], finasteride, Proscar[®]).</p> <p>L'uso della tamsulosina da sola è autorizzato (ad esempio Pradif[®], Tamsulosin T-Mepha[®] retard).</p> | <p>La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante.</p> <p>Finasteride: CIT di 1 mese dopo l'ultima dose (teratogeno).</p> <p>Dutasteride o dutasteride/tamsulosina: CIT di 6 mesi dopo l'ultima assunzione (teratogeno).</p> |
| Urologici | Disfunzione erettile: ad esempio, Viagra [®] . | Accettare. |
| Vasodilatatori | | La decisione sull'idoneità alla donazione viene presa sulla base della malattia sottostante. |