



Trasfusione CRS

Change File Book – Criteri d'attitudine alla donazione di sangue

Versione 2.0

In vigore dal 01.02.2025

Allergie	<p>Misure:</p> <p>Accettare se attualmente i sintomi sintomatologia sono assenti o lievi-minore (grado 1) con o senza trattamento (topico, antistaminici, inalanti).</p> <p>CIT in caso di sintomi di grado 2 fino alla scomparsa dei sintomi.</p> <p>CIT in caso di trattamento con corticosteroidi orali fino a 2 settimane dopo la fine della terapia.</p> <p>CIT in caso di trattamento con immunosoppressori (ad es. anticorpi monoclonali (anti-IgE)) fino a 1 anno dopo la fine della terapia.</p> <p>CIT in caso di sintomi di grado 3 o 4 fino a due settimane dopo il completo recupero.</p> <p>CIT in caso di allergia da contatto ai materiali utilizzati durante la donazione di sangue (disinfezione della pelle, guanti, cerotti) se non sono disponibili altre alternative sul posto.</p> <p>CIT in caso di allergie di grado medio, stagionali fino alla scomparsa dei sintomi.</p> <p>CIT se allergie croniche gravi. In caso di dubbi nella valutazione, consultare eventualmente il medico del STR.</p> <p>Definizione: Le reazioni allergiche (reazioni di ipersensibilità) sono reazioni inadeguate del sistema immunitario a una sostanza normalmente innocua. Gravità e tipi di sintomi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grado 1: prurito, arrossamento, orticaria, gonfiore• Grado 2: grado 1, rinorrea (naso che cola), raucedine, affanno, nausea, vomito, aumento della frequenza cardiaca, calo della pressione sanguigna, aritmia.• Grado 3: grado 1, vomito, gonfiore delle vie aeree, broncospasmo, shock• Grado 4: grado 1, vomito, arresto respiratorio, arresto circolatorio
Anafilassi	Nuovo criterio
Anemia falciforme	Definizione: Nuova
Aneurisma vascolare	Nuovo criterio
Angina pectoris	Nuovo criterio
Anticoagulazione	Nuovo criterio



Aritmia cardiaca	Riferimento da "Rinvio": Fibrillazione atriale (Nuovo) Rinominata da: Aritmia (Nuovo: In relazione con Aritmia) terapia ablativa sostituita con ablazione Nuovo: CID in caso di fibrillazione atriale, anche se trattata con farmaci.
Arteriosclerosi, compresa cardiopatia coronarica	Nuovo criterio
Asma	Misure: Accettare se asintomatico al momento della donazione , anche in caso di applicazione sporadica di inalatori o di trattamento preventivo regolare con inalatori (anche corti-costeroidi per via inalatoria). CIT in caso di trattamento con corti-costeroidi orali fino a 2 settimane dopo la fine della terapia. Definizione: L'asma è caratterizzata da un'inflammatione diffusa delle vie aeree. È causata da molteplici fattori scatenanti che provocano un restringimento reversibile, parziale o completo delle vie aeree. I sintomi comprendono dispnea, senso di oppressione toracica, tosse e respiro sibilante.
Cancro	Misure: Per trattamento terapeutico "immunoterapia" sostituito con "terapia ormonale" CID "malattia ematologica maligna" e "neoplasia associata a viremia" cancellato
Cisti ovarica/ovariche	Nuovo link "Rinvio a da "Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS)" Misure: Accettare se funzione renale normale Definizione: Tumore benigno pieno di liquido, che si forma nelle ovaie. Reperto normale e frequente. Rispettare: Malattie associate (reni policistici o altre patologie).
Cisti renale/i	Nuovo criterio
Congiuntivite allergica	Misure: Accettare (se occhi non fortemente arrossati) Nuovo link "Rinvio a" "Allergie"



Diabetes mellitus

Misure: Accettare se il diabete è controllato da trattamenti dietetici accompagnati o no da antidiabetici orali, in assenza di complicazioni e di segni d'infezione **e in assenza di danni agli organi.**

Accettare in caso di terapia parenterale (eccetto insulina) se:

- **nessun segno di infezione o altre alterazioni cutanee nei siti di punzione**
- **i criteri sopracitati sono soddisfatti**
- **valutazione dell'attitudine alla donazione da parte del medico del STR al momento della prima donazione.**

CIT se il diabete è instabile **o in caso di danni agli organi.**

CID se in trattamento con insulina, ~~o se trattamento con altre medicine parenterali.~~

Disturbo bipolare affettivo

Misure: Nuovo: CIT 1 mese dopo l'ultima assunzione di farmaci con acido valproico o carbamazepina (teratogeni).

Eczema

Misure:

Accettare se

- ~~la superficie interessata è circoscritta,~~
- ~~il punto di accesso venoso è libero,~~
- ~~si tratta di un trattamento locale.~~
- **la superficie interessata è piccola e circoscritta e**
- **il sito di punzione non è interessato e**
- **nessun trattamento o trattamento solo locale**

~~CIT se la ferita è aperta.~~

CIT se aree cutanee aperte fino alla guarigione.

CIT in caso di trattamento con corticosteroidi orali fino a 2 settimane dopo la fine della terapia.

Definizione: La dermatite atopica (spesso chiamata eczema) è un'inflammatione cronica e pruriginosa degli strati superiori della pelle e si manifesta spesso in persone che soffrono di raffreddore da fieno o asma o i cui familiari sono affetti da malattie allergiche

Emicrania

Misure: ~~CIT di 1 mese dopo l'assunzione di diidroergotamina (Dihydrogot® e Cefergot®; in Svizzera non sono più omologati).~~

CIT di 1 mese dopo l'ultima assunzione di farmaci con topiramato (teratogeni).

Emocromatosi

Misure:

"mutazione genetica" sostituita con "predisposizione genetica"

CID se esistono danni a organi (ad eccezione delle artropatie) ~~e se è in corso la salassoterapia.~~



Emoglobinopatia	In relazione con (Nuovo): Talassemia e Anemia falciforme Definizione: Nuova
Endometriosi	Misure: Nuovo: CIT di 2 mesi dopo l'ultima assunzione di farmaci a base di Leuprorelini acetat (teratogeni).
Eritema infettivo	Nuovo criterio
Frattura	Misure: CIT di un mese dopo la rimozione del gesso. CIT di un mese dopo la fine dell'anticoagulazione (sottocutanea) e/o l'allontanamento del gesso se trattamento conservativo (gesso circolare). CIT di 3 mesi dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali.
Herpes labiale	Definizione: Nuova
Herpes zoster	In relazione con: Malattie infettive, contatto Definizione: Nuova
Infarto del miocardio	Rinvio a "Malattie cardiovascolari" cancellato, CID diretta
Insufficienza cardiaca	Rinvio a "Malattie cardiovascolari" cancellato, CID diretta Definizione:
Intolleranza alimentare	Misure: CIT se la sintomatologia è fortemente sintomatica. Rinvio a Allergie. Definizione: L'intolleranza alimentare è una reazione allergica a un determinato alimento.
Iperensione arteriosa polmonare	Nuovo criterio Precedentemente CID "Malattie cardiovascolari"
Malattie cardiovascolari	Accettare se cardiopatia congenita benigna o prolasso della mitrale difetto cardiaco congenito asintomatico, ad esempio operato senza complicazioni e senza antibioterapia profilattica. CID Nuovo: Cardiopatia coronarica (CHD) Misure: riformattato
Malattie infettive, contatto	Misure: CIT: 4 settimane sostituite con CIT di un mese. Rinvio al criterio specifico se e'è presente.
Mastocitosi	Nuovo criterio
Mezzi di contrasto	Nuovo criterio



Morbillo	Misure: CIT di 1 mese dopo la completa guarigione Nuovo link: Malattie infettive, contatto Definizione: Nuovo
Obesità, terapia parenterale	Nuovo criterio
Operazione / Intervento (in generale)	Misure: CIT: <ul style="list-style-type: none">• fino a guarigione completa (e la fine di un trattamento post-operatorio);• calcolare 2 settimane supplementari dopo la fine di un trattamento antibiotico;• calcolare 1 mese supplementare dopo la fine di un trattamento anticoagulante preventivo (sottocutaneo);• calcolare 3 mesi supplementari dopo l'ultima assunzione di anticoagulanti orali;• di 1 mese dopo un intervento minore senza complicazioni;• di 4 mesi dopo un intervento in Paesi con alto tasso di HIV, HBV e HCV;• da 6 a 12 mesi dopo un intervento maggiore (dopo valutazione fatta dal medico del STR).
Orecchioni	Nuovo criterio
Orticaria	Misure: CIT se l'orticaria è generalizzata, fino alla completa guarigione (durata del rinvio da determinare dal medico del STR). Definizione:
Pacemaker	Rinvio a "Malattie cardiovascolari" cancellato, CID diretta.
Raffreddore da fieno	Misure: CIT se sintomi gravi durante la stagione del polline. Rinvio a Allergie Vedere anche Allergie Definizione: Allergia stagionale ai pollini che colpisce principalmente la congiuntiva dell'occhio e la mucosa nasale.
Rosolia	Nuovo criterio
Talassemia	Misure: Nuovo: CID in caso di talassemia major e intermedia. Definizione: Nuova
Transgender / Persone trans	Misure: Il medico del STR deve determinare personalmente l'idoneità alla donazione CIT durante la fase di transizione medica. Nuova: Vedere anche Operazione / intervento (in generale) Definizione: Nuova Rispettare: Secondo studi internazionali, le persone trans, in particolare gli uomini diventati donne, presentano spesso un elevato rischio di HIV. Per la Svizzera non esistono studi sulla prevalenza dell'HIV nelle persone trans. Il comportamento sessuale rischioso o di altro tipo di comportamento rischioso dovrebbe quindi essere tenuto in considerazione.



Trauma cranico (SDH)

Nuovo criterio

Nuovo link "Rinvio a" da "Commozione cerebrale" e "Lesione cranica"

Trombosi coronarica

Rinvio a "Malattie cardiovascolari" cancellato, CID diretta

Varicella

Nuovo criterio

In generale: Ai riferimenti dei capitoli 17 E/F/D sono stati aggiunti gli allegati Art. 7.1/7.2/7.3.